

VIII. — DRYOPHIOPS VAN JAVA.

DOOR Dr. TH. W. VAN LIDTH DE JEUDE.

Van de tot nu toe beschreven soorten van het genus *Dryophiops* werd *D. philippina* Blgr. alleen op de Philippijnen waargenomen, terwijl *D. rubescens* Gray, behalve van Siam en het Maleische schiereiland, ook van Borneo, Sumatra en de Natoena-eilanden werd vermeld. Op Java werd, voor zoo ver mij bekend, nog geen vertegenwoordiger van dit geslacht waargenomen.

Door de goedheid van den Heer P. BUITENDIJK, die reeds zoo veel voor ons verzamelde, kwam ons Museum in het bezit van een *Dryophiops*, gevangen op de koffieonderneming Soembar Aroem in Oost-Java. Ik was in de gelegenheid dit exemplaar te vergelijken met een *D. rubescens* van Billiton in het Amsterdamsch Museum, en het bleek mij, dat ons exemplaar van Java, zoowel van het exemplaar van Billiton, als ook van Jan's afbeelding en Boulenger's beschrijving in enkele opzichten afwijkt.

In de eerste plaats is ons exemplaar, dat eene lengte van ongeveer 64 cm. heeft, veel slanker gebouwd en is ook de kop langer en smaller. Het frontaalschild is aanmerkelijk langer dan het internasale en het prae-frontale samen, terwijl het 186 ventralia en 123 subcaudalia heeft en dus buiten de opgegeven grens 188—199 en 111—136 valt.

De kleur van de bovenzijde is donker groenachtig bruin met eene rij van, op onregelmatige afstanden geplaatste, zeer donker gekleurde vlekken op het midden van den rug. Deze vlekken, meestal driehoekig van vorm, zijn gelegen op den top van de middelste rugschub en strekken zich uit over ongeveer $\frac{1}{3}$ tot $\frac{1}{2}$ van de lengte der schub. Een donkere streep met een lichter middengedeelte strekt zich uit, van af het einde der parietalia, over het interparietale en over 6 tot 7 schubben op het midden van den nek. Van het einde van den snuit loopt aan beide zijden van den kop eene donkere streep door het oog tot aan den mondhoek. Over de bovenzijde van den snuit loopt eene donkere band, die in het midden licht gekleurd is, welke band zich uitstrekt over de internasalia en de prae-frontalia. Eene gegolfde donkerbruine lijn met lichte randen loopt over het supraoculaar schild, een gedeelte van het parietalschild en over het 2^e temporaalschild. Onderzijde van het voorste gedeelte van het lichaam licht geelachtig groen; meer naar achteren donker groenachtig bruin, met onregelmatige donkere vlekjes.

Wanneer later meer javaansche exemplaren worden verzameld, zal door vergelijking kunnen worden uitgemaakt of er werkelijk eene javaansche vorm van *Dryophiops* bestaat, of dat de afwijkingen van ons exemplaar slechts individuele eigenschappen zijn.

Leiden, 8 October 1915.