

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN

ZOOLOGISCHE MEDEDELINGEN

UITGEGEVEN DOOR HET

RIJKSMUSEUM VAN NATUURLIJKE HISTORIE TE LEIDEN

Vol. 40 no. 17

29 oktober 1964

PARNASSIANA NOVA XXXVII

NACHTRÄGLICHE BETRACHTUNGEN ZU DER REVISION DER SUBFAMILIE PARNASSIINAE

(Fortsetzung 10)

von

C. EISNER & K. F. SEDYCH

Parnassius mnemosyne timanicus subsp. nov.

In Nordrussland, östlich von Leningrad wurde das Vorkommen von *P. mnemosyne* L. bisher nicht gemeldet. Sedych erbeutete in den letzten Jahren diese Art wiederholt in der Timan-Gebirgskette. Entgegen jeder Erwartung ist der Charakter der diese bevölkernden *P. mnemosyne* grundlegend verschieden von den subspecies aus Schweden, Norwegen, Estland und auch von subsp. *uralica* Bryk (Topotypus Uralka, Gouv. Orenburg).

Subspecies *timanicus* nov. ist eine stark gynaekotrope Unterart von mittlerer Grösse; ♂ 25-30 mm, ♀ 27-30 mm. Ihr habitus erinnert an stark gezeichnete Vertreter von subsp. *mesoleucus* Fruhstorfer.

♂ im Vorderflügel mit breitem, dunklem Glasband, das sich verjüngend den Hinterrand erreicht. Costalflecke sehr kräftig, häufig als Band bis M_1 ausgebildet. Zellflecke stark, rundlich, der mittlere erreicht nicht die untere Discoidale. Im Hinterflügel Marginale gut ausgeprägt, Costal-Augenfleck bescheiden, Mittel-Augenfleck pastos, Hinterrandsschwärze tief bis zum Hinterrand, die Zelle halb umgreifend und vorn in diese eindringend. Das zweifelhafte Analband stark ausgebildet. ♀ mit mehr oder weniger schwarz überstäubtem Vorderflügel, breiterem Glasband und kräftigerem Costalband als bei den ♂, deutlichem Hinterrandsfleck. Hinterflügel mit breiter Marginale, sehr kräftigen Augenflecken. *Analıs-* und *ocelloconjuncta-*Zustand vorherrschend. Ein ♀ fast völlig melahyalin.

Habitat: Wiesen in Tannenwäldern und an Flussläufen in der Süd-Timan-gebirgskette, Uchtinische und Troizko-Petschorische Bezirke, Komi A.S.S.R. Fundplätze: Sakscha, Krutaja, Latsch, Umgebung Uchta.

1 ♂ Holotype, 1 ♀ Allotype, 8 ♂ 3 ♀ Paratypen in coll. Eisner in Sammlung Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden, weitere ♂♀ Paratypen in coll. Sedych.




Fig. 1-2, *Parnassius mnemosyne timanicus* subsp. nov., Uchta.
1, Männchen, Holotype; 2, Weibchen, Allotype.