

X. — DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE ESPÈCE DE DINEUTES
(FAM. GYRINIDAE COL.) DE L'ÎLE DE FORMOSA.

PAR LE Dr. D. L. UYTENBOOGAART.

Dineutes sauteri nov. sp.

Long. 16—17 mm. — Ovatus, latus, antice magis quam postice attenuatus, utrinque valde depressus; in regione scutellari fortiter convexus; supra subtilissime reticulatus et leviter sed densiter punctulatus, in medio cupreo-micans, utrinque coerulescens et paululum sericeus; infra nigropiceus, tarsis mediis et posticis ferrugineis; elytris apice rotundatis, extus vix subsinuatis, angulo suturali valde rotundato. ♂ Femoribus anticis sulcatis et ante apicem dentatis; tibiis vix incurvatis, angulo apicali externo recto, leviter deleto.

Très voisine de *fulgidus* Rég., s'en distinguant par les caractères suivantes:

Coloration plus brune en dessus, noir de poix en dessous avec les tarses des pattes natatoires ferrugineux.

Tibias ant. du ♂ courbés en dehors vers le sommet avec l'angle apical extérieur droit un peu dilaté en dehors.

Gibbosité scutellaire encore plus forte, les élytres encore plus dilatées, ce qui la donne l'aspect très large et court surtout chez le ♂. Angle sutural des élytres largement arrondi. Elytres avec une ponctuation obsolette plus dense et pas si fine que chez *fulgidus* Rég.

Formosa (lac Candidius); 3 exemplaires (2 ♂ 1 ♀) dans la collection du musée de Leiden, trouvés par M. H. Sauter.

Rotterdam, le 16 septembre 1915.
