

# M I L V I

PAR

H. SCHLEGEL.

Octobre 1862.

Queue plus ou moins échancrée.

**MILVUS.** Taille forte; queue longue et visiblement échancrée; plumes des jambes longues; plumage brun.

a. Tarses écussonnés.

**MILVUS REGALIS**, Brisson. — *Falco milvus*, Linné.

Aile 18 pouces et demi à 19 pouces et demi. Queue: pen\_nes externes 13 pouces et demi, plumes internes 10 pouces à 10 pouces et demi. Plumage varié de roux clair, de brun et de blanchâtre; rémiges d'un noir brunâtre; queue rousse en dessus.

Habite l'Europe; visite en hiver la basse Égypte.

1. Femelle adulte, tuée de 15 Mars 1855, Gueldre, présentée par Mr. le Baron Sloet van Toutenburg. — 2. Adulte, tué près de Hanau, par Mr. Leissler. — 3. Femelle au premier plumage, tuée en Octobre 1859, Gueldre, présentée par Mr. Bronkhuizen. — 4. Femelle au premier plumage, prise au filet

des fauconniers et présentée par H. Schlegel, le 27 Octobre 1843, près de Valkenswaard. — 5. Jeune pris peu de tems avant de sortir du nid, environs de Dessau, acquis en 1861. — 6. Jeune, en grande partie en duvet, pris du nid en Mai 1861, Brunswick, par Mr. Blasius. — 7. Très jeune en duvet, âgé de quelques jours, Brunswick, 1859, par Mr. Blasius.

8. Crâne, Hollande, du Cabinet d'anatomie.

**MILVUS GOVINDA**, Sykes. — *Milvus melanotis*, Schlegel, *Fauna japonica*, Aves, pl. 5 et 5 B. — *Haliaëtus lineatus*, J. E. Gray, *Illustr. Ind. Zool.*, pl. 18.

Taille du *Milvus regalis*, mais à queue beaucoup moins échancrée, à plumage souvent plus foncé, et avec une bande noire s'étendant des freins le long de la partie supérieure de la région des oreilles. Plantes des pieds avec des aspérités aiguës.

Observé au Japon, dans la Chine, au Nipaul, au Deccan et dans la Babylonie (Horsfield). — Commun aux environs d'Emoy en Chine; très vorace et audacieux; fait entendre une espèce de chant assez agréable (G. Schlegel).

1. Adulte, Nipaul, présenté par Mr. Hodgson. — 2. Mâle adulte, tué le 2 Janvier 1860, Emoy en Chine, présenté par Mr. G. Schlegel. — 3. Femelle, tuée le 6 Novembre 1859, Emoy en Chine, présentée par Mr. G. Schlegel. — 4. Mâle au premier plumage, tué le 28 Décembre 1859, Emoy en Chine, présenté par G. Schlegel. — 5. Adulte, Chusan en Chine, par Mr. Frank, 1860. — 6. Adulte, Japon, 1844; individu figuré dans la *Fauna japonica*, Aves, pl. 5 B. — 7 et 8. Adultes, Japon, voyage de von Siebold. — 9 et 10. Adultes, Japon, voyage de Bürger. — 11. Individu au premier plumage, Japon, voyage de von Siebold: individu figuré dans la *Fauna japonica*, Aves, pl. 5.

12. Squelette, Japon, voyage de Mr. Bürger.

**MILVUS AETOLIUS**, Belon. — *Milvus niger*, Brisson. — *Falco ater*, Gmelin.

Aile 15 et demi à 16 et demi pouces. Queue: pennes externes 10 pouces à 12 pouces et demi; internes 8 pouces 6 lignes à 9 pouces 6 lignes. Plumage d'un brun foncé, tirant sur le dessous au roux, passant souvent au blanchâtre sur la tête, et les plumes offrant ordinairement, le long de leur tige, une raie foncée. — S'établit dans les bois situés dans le voisinage des plaines et des eaux douces. Se nourrit de préférence de poissons et de grenouilles.

Habite l'Europe tempérée et chaude. On le dit également venir de l'Afrique septentrionale.

1. Femelle adulte, tuée près de Hanau, de la collection de Leissler. — 2. Femelle adulte, tuée en Mai 1860, près de Sarepta, bords du Wolga inférieur, acquise de Mr. Möschler. — 3. Mâle adulte, tué le 4 Juin 1860 près de Voorhout en Hollande, présenté par Mr. A. Diemel. — 4. Femelle adulte, Allemagne, présentée par H. Schlegel. — 5. Mâle au premier plumage tué en été 1860, dans le duché d'Anhalt. — 6. Femelle au premier plumage, tuée en été 1860, dans le duché d'Anhalt.

#### MILVUS AFFINIS, Gould.

Absolument semblable au *Milvus aetolius*, mais à taille un peu moins forte. Aile 14 pouces 6 lignes à 15 pouces 4 lignes. Observé dans l'Australie et dans les îles de Sumatra et de Timor.

1. Adulte, Australie. — 2. Adulte, Australie, Frank, 1860. — 3. Individu au premier plumage, Australie, voyage de Gould. — 4. Mâle, livrée parfaite, tué en Juillet 1829, Timor occidental, voyage de S. Müller.

5. Squelette de femelle, Padang à Sumatra, voyage de Mr. S. Müller. — 6. Squelette de mâle, Timor, voyage de Mr. S. Müller.

**MILVUS AEGYPTIUS**, G. R. Gray. — *Falco aegyptius* et *Forskâlii*, Gmelin. — *Falco parasiticus*, Latham.

Très voisin du *Milvus aetolius*, mais d'une taille moins forte

et reconnaissable à son bec d'un jaune uniforme dans les adultes, d'un jaune nuancé de brun dans les jeunes. Aile 14 pouces à 15 pouces et demi. Dans les jeunes, la queue est beaucoup moins échancrée que dans les adultes.

Habite la plus grande partie de l'Afrique; également observé dans la Dalmatie, la Grèce et l'Asie mineure. — Il est hardi, très vorace et peu épouvanté des hommes, enlevant la volaille des basses-cours et même les poissons des paniers que les pêcheurs ont l'habitude de porter sur la tête. Niche sur des arbres ou des rochers.

1. Femelle adulte, Cafrérie, voyage de Brehm, 1828. —
2. Femelle adulte, Sennaar, présentée par Mr. Ruyssenaers. —
3. Mâle adulte, tué le 6 Janvier 1844, Côte d'or, voyage de Pel; iris brun foncé, bec et pieds jaunes (Pel). —
4. Mâle adulte, tué le 6 Janvier 1841, Côte d'or, voyage de Pel. —
5. Femelle adulte, Rio Boutry, Côte de Guinée, voyage de Pel. —
6. Femelle adulte, tuée en Décembre 1842, Côte d'or, voyage de Pel. —
7. Jeune mâle, Sénégal. —
8. Femelle, habit de passage, Égypte, présentée par S. Exc. Mr. Clot-Bey. —
- 9 et 10. Femelles au premier plumage, Sénégal, acquises en 1862 de Mr. Moritz.

b. Tarses réticulés.

**MILVUS ISIURUS**, Gould, Birds of Australia, vol. I, pl. 22.

Se reconnaît facilement à ses tarses réticulés, à ses ailes très longues, à ses doigts garnis seulement chacune de trois plaques, à son bec faible et délié, à sa queue à peine sensiblement échancrée; aux plumes de la nuque assez allongées et à la région des freins couverte de plumes soyeuses et plus serrées que d'ordinaire. Teintes rappelant celles du milan royal.

Habite la Nouvelle Hollande. Se tient dans les bois. Niche sur des arbres dans les forêts; ponte de deux oeufs, presque orbiculaires et d'un blanc jaunâtre, tacheté ou moucheté de brun-rouge. Se nourrit principalement d'oiseaux (Gould).

1. Australie, voyage de Mr. Gould. Aile 18 pouces. Queue 9 pouces et demi.

**ELANOIDES.** Milans-hirondelles. — Queue très longue et échancrée jusque sur le milieu de sa longueur. Teintes blanches et noires ou grises.

**ELANOIDES FURCATUS**, Vieillot. — *Falco furcatus*, Linné. — *Nauclerus furcatus*, Vigors.

Aile 15 pouces à 15 pouces et demi; pointe de l'aile 7 pouces. Queue: plumes externes 12 à 13 pouces, internes 5 à 6 pouces. Blanc; queue, ailes et manteau noirs.

Habite les parties chaudes de l'Amérique; s'égaré quelquefois jusqu'en Angleterre. — Il aime le séjour des savannes, où on le voit ordinairement en petites troupes de vingt à trente individus. Il fait la chasse aux serpens, aux lézards et particulièrement aux insectes ailés, qu'il avale souvent en volant. Il sait exécuter, au moyen de sa queue et de ses longues ailes, les mouvemens les plus brusques. Il ne se repose que rarement et son vol est extrêmement léger. Quand on a abattu un de ces oiseaux, ses camarades ont, comme les hirondelles de mer, l'habitude de se rassembler autour de la victime blessée ou morte, et s'exposent ainsi aux coups du chasseur. Niche sur des arbres, et pond trois à quatre oeufs. L'époque de la propagation passée, cette espèce se réunit en troupes plus ou moins nombreuses (Wilson, Audubon et Neuwied). Schomburgk, voyage, III, p. 735, l'a observé, soit par couples, soit par bandes, dans les forêts le long de la côte de la Guyane anglaise.

1. Femelle au plumage parfait, Surinam. — 2. Femelle au plumage parfait, Surinam, 1858.

**ELANOIDES RIOCOURII**, Vieillot, Galerie, I, pl. 16. — *Falco Riocourii*, Temm., Pl. col. 85. — *Milvus Riocourii*, Schlegel, Handleiding, Ois., pl. 1, fig. 5. — Sous-genre *Chelodipteryx* chez Kaup.

Reconnaissable à sa petite taille, à ses teintes, grises sur le dessus, blanches sur le dessous, et à ses ailes, dont la première rémige, qui est la plus longue, ne dépasse que très peu la troisième. Longueur totale un pied. Ailes 9 pouces. Queue: penne externe 6 pouces et un quart à 7 pouces; penne interne 3 pouces et demi à quatre pouces. Doigt du milieu 10 lignes. Ongles blanchâtres.

Observé dans la Sénégambie.

1. Adulte, Sénégal.

**ELANUS.** Faux Milans. — Très caractérisés par leur ongles, à l'exception de celui du doigt du milieu, arrondis, c'est à dire, sans bords tranchants. Taille peu considérable ou petite. Queue un peu fourchue au milieu, mais arrondie vers les côtés, en sorte que la penne externe est plus courte que la suivante, qui est la plus longue de toutes. Tarses et doigts courts, revêtus de très petites écailles, à l'exception de 2 à 3 plaques garnissant la phalange terminale. Habitent les contrées chaudes des deux mondes.

a. Plumage teint de blanc, de gris et de noir. Ailes aboutissant à l'extrémité de la queue. Deuxième rémige dépassant la troisième.

**ELANUS MELANOPTERUS;** Leach. — *Falco melanopterus*, Daudin. — *Elanus caesius*, Savigny. — *Elanus melanopterus* et *minor*, Ch. L. Bonaparte.

Longueur totale 11 à 12 pouces. Ailes 9 pouces et demi à 10 pouces. Queue 4 pouc. à 4 pouc. 6 lignes au milieu avec une échancrure profonde de 6 à 8 lignes. Tarse 1 pouce et demi. Doigt du milieu un pouce. — Iris de l'oeil d'un orangé vif. Cire et pieds jaunes. En dessous d'un blanc tirant un peu au gris sur les flancs. En dessus d'un gris cendré. Une tache noire au dessus de l'oeil et les couvertures supérieures des ailes noires, les inférieures d'un blanc uniforme, les grandes quelquefois avec des traces de taches noirâtres, grandes

remiges noirâtres à leur face inférieure. Ongles et bec noirs. Cire et serres jaunes. Iris d'un jaune d'orange. Dans les jeunes, le dessus tire au roux, et les plumes du manteau et de l'aile offrent des bords blancs; jabot lavé de roux et les plumes de la poitrine à tiges rousses. — Je ne vois point de différence entre les individus de l'Afrique et du Nipaul.

Cette espèce, observée depuis l'Égypte jusqu'en Abyssinie, en Barbarie, en Sénégambie et au Cap de B. Espérance, paraît être répandue dans toute l'Afrique; elle vient aussi du Nipaul, et s'égaré quelquefois dans le midi de l'Europe et même en Allemagne. — Cet oiseau se nourrit de toutes sortes d'insectes, notamment de sauterelles; il n'attaque les oiseaux que dans le but de les chasser du domaine qu'il s'usurpe. Il aime à se percher sur la cime des hauts arbres. C'est le plus souvent au vol qu'il fait entendre son cri qui est très perçant. Il répand une forte odeur de musc, laquelle se communique même à ses excréments (Le Vaillant).

*a.* Individus de l'Afrique.

1. Femelle, livrée parfaite, Afrique australe, voyage de van Horstock. — 2. Femelle, livrée parfaite, Afrique australe, voyage de Verreaux, acquise en 1858. — 3. Mâle, habit de passage, Afrique australe, voyage de J. Verreaux, acquise en 1858. — 4. Femelle au premier plumage, Afrique australe, voyage du Dr. van Horstock.

*b.* Individus du Nipaul: types de l'*Elanus minor* de Ch. L. Bonaparte.

5 et 6. Mâles au plumage parfait, Nipaul, présentés par Mr. Hodgson. — 7. Femelle, habit de passage, Nipaul, présentée par Mr. Hodgson.

8. Crâne, Cap, voyage de Mr. van Horstock.

**ELANUS INTERMEDIUS.**\*) — *Elanus axillaris*, Temm., Mus. Ned.

\*) Mr. Gould a décrit, sous le nom d'*Elanus hypoleucus*, un oiseau rapporté

Semblable à l'*Elanus melanopterus* par ses teintes, mais d'une taille plus forte, à face inférieure des grandes rémiges blanchâtre à leur base, et à tache noire aux grandes couvertures inférieures des ailes sensiblement prononcée. Aile 10 pouces 6 lignes à 11 pouces 3 lignes. Queue 5 pouces à 5 pouces 6 lignes.

Observé à Java, à Bornéo et à Célèbes.

1. Adulte, Java occidental, voyage de Müller. — 2. Adulte, Java, 1858, — 3. Mâle, livrée de passage, Bandjermassing à Bornéo, voyage de Schwaner. — 4. Individu dans la livrée de passage, Célèbes septentrional, voyage de Forsten.

5. Crâne, Célèbes septentrional, voyage de Forsten.

**ELANUS AXILLARIS**, G. R. Gray. — *Falco axillaris*, Latham. — *Elanus notatus*, Gould.

Absolument semblable à l'*Elanus intermedius* par sa taille et ses teintes en général; mais le gris de la tête, des parties supérieures et de la queue est beaucoup plus clair et tirant fortement au blanc, et la tache noire sur les couvertures inférieures des ailes est assez grande.

Habite l'Australie.

1. Adulte, Australie, voyage de Mr. Gould. — 2. Adulte, Australie, par Mr. Frank.

**ELANUS LEUCURUS**, G. R. Gray. — *Milvus* et *Elanoides leucurus*, Vieillot. — *Falco melanopterus*, Bonap., Contin. of Wilson, pl. 2, fig. 1. — *Falco dispar*, Temm., Pl. col. 319.

En tout point semblable, par la distribution de ses teintes, à l'*Elanus axillaris*, mais à queue plus allongée. Aile 11 pouces. Queue 6 pouces 6 lignes.

de Macassar par Mr. Wallace et voisin à ce qu'il paraît, de notre *intermedius*, mais différent par une taille un peu plus forte et le manque total d'une tache noire sur les couvertures inférieures des ailes. Aile 11 pouces 6 lignes, queue 6 pouces 4 lignes (Gould). Voir les *Proceed. Zool. Soc. London*, 1859, p. 127.

1. ? Squelette, Macassar, voyage de Mr. S. Müller.

Observé dans les parties chaudes de l'Amérique.

1. Individu au plumage parfait, Caracas, présenté par Mr. van Lansbergen. — 2. Individu au plumage parfait, Haïti, présenté par Mr. Ricord. — 3. Individu dans la livrée de passage, Caracas, présenté par Mr. van Lansbergen.

b. Teintes vives. Ailes ne couvrant que deux tiers de la queue. Deuxième et troisième des rémiges d'égale longueur.

**ELANUS SWAINSONII** — *Gampsonyx Swainsonii*, Vigors. — *Elanus torquatus*, Cuvier. — *Falco rufifrons*, Pr. Max.

De petite taille. Longueur totale 8 à 9 pouces. Aile 5 pouces 9 lignes à 6 pouces 3 lignes. Queue 3 pouces 8 lignes à 4 pouces. Front et régions des oreilles d'un jaune brunâtre ardent. Plumes des jambes d'un roux clair. Sommet de la tête, dos, ailes et dessus de la queue noirâtres. Nuque avec un collier blanc bordé par derrière de brun-rouge. Parties inférieures blanchâtres.

Observé au Brésil, en Colombie, et dans la Guyane anglaise. Il est rare dans cette dernière contrée, suivant Schomburgk, p. 735, et on voit ordinairement le mâle avec sa femelle perchés ensemble sur des branches d'arbres bordant les rivières.

1. Mâle au plumage parfait, Brésil. — 2. Mâle au plumage parfait, Colombie, présenté par Mr. van Lansbergen. — 3. Femelle au plumage parfait, Brésil, voyage de Mr. Natterer. — 4. Mâle à peu près au plumage parfait, Colombie, présenté par Mr. van Lansbergen.

**ICTINIA**. Milans-faucons.

Ce sont des milans d'une taille peu forte, à plumage noirâtre et grisâtre, mais à queue carrée ou à peine échancrée, et qui se rapprochent des faucons par leur physionomie et leurs habitudes, ainsi que par leur bec, pourvu à la mandibule supérieure d'un feston un peu anguleux, qui répond à une faible échancrure de la mandibule inférieure. Narines orbiculaires.

Serres très faibles ; tarses et doigts revêtus par devant de plumes. Ailes dépassant notablement la queue. Ils viennent des parties chaudes de l'Amérique.

**ICTINIA MISSISSIPENSIS**, Kaup. — *Falco mississippiensis*, Wilson. — *Ictinia ophiophaga*, Vieillot.

Longueur totale 13 à 14 pouces. Aile 11 pouces. Queue 6 pouces. Doigt du milieu un pouce. Tarse un pouce 9 lignes. Tête, cou, parties inférieures et rémiges secondaires d'un blanc grisâtre. Dos, ailes, queue et région des freins noirâtres. Rémiges primaires plus ou moins variées de rouge vers leur barbe interne. Serres et iris de l'oeil d'un beau rouge. Bec noir. Deuxième rémige, qui est la plus longue de toutes, dépassant à peine la troisième ; première intermédiaire entre la cinquième et la sixième. Se nourrit de saute-relles.

Habite les parties méridionales de l'Amérique du Nord.

1. Mâle adulte, Louisiane. — 2. Femelle adulte, Ohio, 1858.

**ICTINIA PLUMBEA**, Vieillot. — *Falco plumbeus*, Gmelin. — *Milvus cenchris*, Vieillot. — *Ict. (Poëciloptyx) plumbea*, Kaup.

Voisin de l'*Ictinia mississippiensis* ; mais s'en éloignant par sa taille un peu moins forte, par sa queue plus courte et pourvue de trois bandes blanches, par ses ailes sans bande claire et fortement teintes de brun rouge sur les barbes internes des grandes rémiges, par ses teintes claires d'un gris assez foncé, et par la longueur comparative des rémiges. Troisième rémige, la plus longue de toutes, ne dépassant que peu la quatrième ; deuxième intermédiaire entre la troisième et la quatrième ; première égalant la sixième. Iris rouge. Serres d'un jaune d'orange vif. La couleur des jeunes tire au brun et ils ont le dessus varié de blanc. — Longueur totale 12 à 13 pouces. Aile 10 à 11 pouces. Pointe de l'aile 4 pouces et demi. Queue 5 pouces à 5 pouces et demi. Doigt du milieu 11 lignes.

Commun au Brésil, se trouve jusque dans la Louisiane. Son vol est puissant. Il aime à se percher sur la cime des hauts arbres, d'où il guette sa proie qui consiste en insectes et en oiseaux (Neuwied). Schomburgk, p. 735, l'a observé dans les forêts bordant la côte de la Guyane anglaise. On l'y voit, soit perché sur les branches les plus élevées des cimes des arbres, soit planer dans les airs à perte de vue. Il construit son nid sur des arbres élevés.

1. Mâle au plumage parfait, Cayenne, acquis en 1838. — 2. Femelle au plumage parfait, Cayenne. — 3. Femelle au plumage parfait, Haiti, présentée par Mr. Ricord. — 4 et 5. Femelles au plumage parfait, Surinam. — 6 et 7. Femelles, livrée parfaite, Brésil, acquises de Mr. Frank en 1859. — 8. Mâle au premier plumage, Cayenne: individu figuré dans les Planches coloriées 180.

## R É S U M É.

		Indiv. montés.	Squelettes.	Crânes.
Milvus regalis.	p. 1.	7		1
" govinda.	" 2.	11	1	
" actolius.	" 2.	6		
" affinis.	" 3.	4	2	
" aegyptius.	" 3.	10		
" isiurus.	" 4.	1		
Elanoides furcatus.	" 5.	2		
" Riocourii.	" 5.	1		
Elanus melanopterus.	" 6.	7		1
" intermedius.	" 7.	4		1
" hypoleucus P	" 7.		1	
" axillaris.	" 8.	2		
" leucurus.	" 8.	3		
" Swainsonii.	" 9.	4		
Ictinia mississippiensis.	" 10.	2		
" plumbea.	" 10.	8		

---

 72

---

 4

---

 3

Total 79 échantillons.