

NOTE XXIX.

DESCRIPTION DE DEUX VARIÉTÉS NOUVELLES DU
CHELISOCHES LUDEKINGI, DOHRN.

PAR

A. de BORMANS.

Cette espèce, décrite sous le nom de *Lobophora Ludekingi* ¹⁾ et dont les types ♂ que j'ai sous les yeux appartiennent au Musée de Leyde, présente comme le *Ch. morio* Fabr., et probablement bien d'autres *Chelisoches*, de grandes variations dans la dimension et les détails de forme des pinces (la forme générale restant la même).

Un exemplaire mâle, pris à Soepajang (Sumatra) en Avril 1877 pendant l'Expédition Scientifique Néerlandaise, a les pinces très courtes et très robustes (longueur 3 millim). La dilatation basale très amplifiée forme une petite crête redressée; la dent qui la suit est forte et a deux pointes, l'une en dessus, l'autre en dessous; la dent située vers l'apex est large mais émoussée, ainsi que les pointes.

Une autre variété appartient également au Musée de Leyde; elle vient de Tandjong Morawa (Sumatra) où elle a été prise par le Dr. B. Hagen; elle est tout l'opposé de la précédente; les branches de la pince, aussi longues que celles du type, sont plus grêles, forment ensemble une courbe fermée bien plus allongée, et en outre de la dilatation basale présentent seulement au bord interne une série non interrompue de crénelures égales.

1) Dohrn, Stett. Ent. Zeit. Bd. XXVI, S. 73 (1865).