

NOTE XXXI.

DESCRIPTION DU MÂLE DE L'IPHOTHIMORHINUS
AUSTRALASIAE, Roel.

PAR

W. ROELOFS.

Dans la collection R. Oberthür se trouvent deux individus (♂ et ♀), de cette espèce, dont je ne connaissais que la femelle lors de ma description de l'insecte ¹⁾.

Le mâle diffère assez notablement de l'autre sexe, surtout par la construction du rostre, qui est un peu plus long et n'a pas la forme gibbeuse de celui de la ♀, sa grosseur est plus égale de la base à l'extrémité et présente en dessous un double rang de poils bruns, moins raides que chez certaines espèces du genre *Poteriophorus*; les antennes sont un peu plus distantes de la base, la ligne imprimée sur le devant du rostre est plus forte, il est vaguement ponctué sur les côtés. Le prosternum est enflé devant les hanches antérieures, et vaguement ponctué, le métasternum est largement concave ainsi que le premier segment abdominal et une grande partie du deuxième; l'abdomen et le bout du pygidium sont légèrement pubescents. Les cuisses et les jambes, sauf la base des dernières, sont garnis d'une rangée de poils bruns assez longs.

Le pénis a la forme d'une lame courbée partout de largeur égale et dont les bords sont un peu saillants.

L'unique individu ♂ que j'ai sous les yeux est d'une

1) Notes from the Leyden Museum, Vol. XIV, 1892, p. 207 et suivants.

couleur un peu plus foncée que les femelles que je connais, les taches noires sont plus grandes et le bout des élytres est noir sur une assez grande étendue.

Les individus de la collection Oberthür proviennent de la collection Mniszech, la ♀ porte l'indication: Australie, Endeavour river ¹⁾.

1) Par la tête soulevée du ♂, j'ai pu m'assurer, que les yeux de l'espèce sont assez fortement séparés en-dessous.

La Haye, Mars 1893.