

NOTE XIV.

SUPPLÉMENT À LA RÉVISION DES ONTHOPHAGUS
DE L'ARCHIPEL INDO-NEERLANDAIS

PAR

J. W. van LANSBERGE.

II. 1)

18 bis. *O. ventralis* Lansberge, sp. nov.

Ovatus, subnitidus, parce griseo setosus, piceus, thoracis marginibus antice, elytrorum maculis basalibus femoribusque rufis, pygidio rufo, piceo-maculato, tarsis antennisque rufis, clava testacea. Totus confertim punctulatus; thorace antice binodoso; elytris distincte striatis, interstitiis convexis. — Long. 6 m.m.

Mas. Clypeo medio elevato producto, vertice carina obsoleta, subbidentata armato.

Fem. Clypeo medio subtruncato, capite bicarinato, carina postica altiore.

Ovalaire, peu brillant par suite de la forte ponctuation, noir avec des taches fauves, recouvert en dessus de petits poils gris, le chaperon bordé de brun, les 4 cuisses postérieures jaunâtres, les tibias bruns, les tarsees et les antennes fauves avec la massue jaune. Bord du pygidium,

1) Le Supplément I se trouve à la fin de la „Révision.”

des arceaux ventraux, du sternum et des cuisses antérieures jaunâtre.

Tête ponctuée en râpe, subogivale, à chaperon relevé antérieurement, subtriangulaire dans le mâle, subtronqué dans la femelle. Dans le mâle il y a, en arrière des yeux, une carène peu marquée, subdentée de chaque côté, dans la femelle deux carènes parallèles assez élevées, surtout la postérieure.

Corselet couvert d'une ponctuation grossière, non rebordé à la base, sillonné en arrière, à bords latéraux ornés en avant de taches fauves. Sur le disque en avant deux tubercules un peu plus prononcés dans le mâle.

Elytres ayant des stries distinctes et des intervalles convexes, couvertes d'une ponctuation dense mais plus fine que celle du corselet. Les intervalles pairs ont chacun à la base une tache fauve. L'extrémité de l'élytre est colorée de même mais souvent ces taches font défaut à l'exception de la tache humérale. Pygidium fortement ponctué, subcaréné.

Métasternum caréné en avant. Cuisses couvertes de gros points épars, tibias et tarses assez robustes, à métatarse unidenté.

Cette espèce constitue un type dégénéré du groupe à carène munie de deux cornes dans le mâle. Elle est reconnaissable aux taches jaunes dont elle est ornée en dessus et en dessous combinées avec les tubercules du prothorax. — Elle vient de Sumatra. — Musées de Leyde et de Gènes.

42 bis. *O. Sundanensis* Lansberge, sp. nov.

Oblongo-ovatus, subnitidus, griseo-hirtus, niger, tarsi antennisque brunneis, clava testacea. Capite bicarinato, carina antica arcuata, postica subtrituberculata, altiore; thorace fortiter punctato, postice medio impresso, antice subretuso; elytris obsolete striatis, interstitiis subcostatis, sat fortiter punctulatis. Fem. — Long. 10 m.m.

De forme oblongue, médiocrement brillant, couvert de

poils gris plus longs en dessous, entièrement noir, les tarses et les antennes bruns, la massue jaune.

Tête sémicirculaire, bicarénée, la carène antérieure arquée, la postérieure droite, plus élevée, subtridentée. Chaperon court, rugueux. Espace entre les deux carènes enfoncé, ayant seulement quelques points.

Corselet rétus en avant, la partie rétuse subcarénée, renflé à la base mais ayant au milieu une incision triangulaire comme dans les *O. incisus* et *rorarius*. Bords latéraux dilatés, assez fortement sinués en arrière. Ponctuation irrégulière, assez forte.

Elytres ayant des stries peu marquées mais rendues plus apparentes par la convexité des intervalles qui sont costiformes, aspéro-ponctués. Pygidium peu convexe, grossièrement ponctué.

Métasternum tuberculé en avant, canaliculé en arrière. Cuisses élargies, ponctuées, tibias fortement évasés à l'extrémité, tarses médiocres, à métatarse unidenté.

Java, Bandong (Sijthoff). — Musée de Leyde.

Je ne connais qu'un exemplaire femelle de cette espèce qui rentre dans le groupe déjà nombreux des *O. incisus* etc. Il est probable que le mâle aura le vertex armé de deux cornes et je serais assez porté à croire que ce sera le cas dans tout le groupe, qui devrait par conséquent être transféré dans une autre division. Le mâle d'une espèce voisine, pourvu de cornes très développées m'a été communiqué par Mr. Gestro. On en verra la description ci-après. Le mâle de l'*O. pedator* Sharp qui appartient évidemment au groupe, a une armature analogue et je possède encore une grande espèce voisine originaire de la Chine chez laquelle cela est également le cas.

42 ter. *O. Sumatranus* Lansberge, sp. nov.

Oblongo-ovatus, sericeus, supra nigro pilosus, subtus griseo vestitus, niger, pedibus piceis, tarsis antennisque rufis, clava testacea. Capite rugoso, bicarinato, carina postica medio obsolete dentata, utrinque in cornu desinente; thorace

Notes from the Leyden Museum, Vol. V.

antice carinato, carina medio interrupta, utrinque ad latus carinula instructo, margine laterali antice et postice sinuato; elytris obsolete striatis, interstitiis planis, aspero-punctatis.
Mas. — Long. 13 m.m.

De forme allongée, noir, soyeux, recouvert en dessus de courts poils noirs, en dessous de longues soies grises, les pattes brunes, les tarses et antennes fauves avec la massue jaune.

Tête rugueuse, subgivale, à chaperon subtronqué en avant, séparé du front par une faible carène arquée. Vertex surmonté d'une seconde carène, élevée, tranchante ayant au milieu une petite dent et se terminant de chaque côté par une corne.

Corselet convexe, couvert de points plus faibles sur le disque, se changeant en granulations en avant, un peu tronqué antérieurement, la troncature limitée par deux petites carènes transversales, séparées par un sillon obsolète qui traverse le dos et aboutit à une dépression médiane de la base. Celle-ci cachée par un renflement qui va rejoindre une petite carène latérale placée au milieu au dessus de la fossette latérale. Bords latéraux fortement sinués avant et après leur milieu, l'angle antérieur arrondi, relevé, le postérieur distinct.

Elytres planes, à stries peu marquées, lisses, subponctuées, et intervalles aspéro-ponctués, surtout les latéraux. Pygidium grand, convexe, fortement ponctué.

Métasternum faiblement canaliculé en arrière, ponctué. Cuisses ayant des séries de gros points. Tibias robustes, en triangle allongé. Tarses assez allongés, à métatarse arqué, unidenté.

Un seul exemplaire mâle trouvé par le Dr. O. Beccari sur le mont Singalan, Sumatra. La femelle aura probablement la carène occipitale tridentée avec la dent du milieu la plus développée. Cette espèce est du reste facilement reconnaissable à son reflet soyeux et à la forme bien caractérisée du corselet. — Musée de Gênes.

67 bis. *O. mutabilis* Lansberge, sp. nov.

Oblongo-ovatus, nitidus, breviter setosus, obscure aeneus, elytris fuscis, plus minusve testaceo signatis, femoribus testaceis, tibiis antennisque rufis, clava grisea. Capite clypeo bidentato; fronte convexa, vertice inter oculos carina obsoleta, arcuata munito; thorace mulico, crebrè punctato; elytris planis, haud profunde striatis, subseriatim punctatis. Fem? — Long. 4 m.m.

De forme ovalaire un peu allongée, aplatie, brillant, couvert en dessus de poils très courts, bronzé, les élytres noirâtres avec des taches d'un testacé fauve à la base sur les intervalles pairs et à l'extrémité, ces taches faisant quelquefois défaut ou bien envahissant presque toute l'élytre. Cuisses testacées, le reste des pattes brun rouge. Antennes fauves à massue grise. Abdomen tacheté de jaune.

Tête rugueuse, subrhomboïdale, à chaperon bidenté et front muni d'une petite élévation arrondie. Entre les yeux une petite carène arquée, au devant de laquelle le front est légèrement creusé.

Corselet inerme, régulièrement arrondi latéralement et aux angles postérieurs, non rebordé à la base, couvert d'une ponctuation assez dense et assez grossière.

Elytres planes, un peu enfoncées à la suture, faiblement striées, les intervalles couverts de rangées de petits points irréguliers. Pygidium fortement ponctué.

Cuisses ponctuéées. Tibias et tarsi grêles. Métatarse arqué, inerme.

Cette espèce a été trouvée à Tjibodas (Java) par le Dr. Beccari. Quoique n'offrant rien de bien remarquable elle est reconnaissable à son chaperon bidenté. Cette particularité me fait croire qu'elle doit rentrer dans le groupe des *O. battilifer*, *deflexicollis* etc. et que le mâle aura le chaperon acuminé et relevé. Elle se distingue des deux espèces précitées par la ponctuation beaucoup plus forte du corselet et sa taille plus petite. — Musée de Gènes.