

NOTE IX.

NOVA SPECIES CUCUJIDARUM.

AUCTORE

J. R. H. NEERVOORT van de POLL.

Inopeplus Olliffi, v. d. Poll.

Nitidissimus, aterrimus, mandibulis palpisque rufotestaceis, labro, antennarum articulis duobus basali us, tarsisque dilute testaceis; elytra abdominis segmenta quatuor ultima haud obtegentia. — Long. 4 mm.

Caput latum, juxta oculos impressione profunda instructum, commati transverse posito simili (♣) grosse et sat dense punctatum. *Thorax* latus brevisque, capite haud latior; lateribus anguste marginatis, antice rotundatis, basin versus valde angustatis et paulisper emarginatis; angulis anticis prominulis, posticis dentiformibus prominentibus; basi late bilobata; evidenter sed sparse punctatus. *Elytra* longitudine aequa capiti prothoracique conjunctis, thorace latiora, apicem versus ampliata, punctis aliquot, fere haud conspicuis, irregulariter instructa. *Abdomen* elytrorum longitudine, paulo angustius, postice rotundato-angustatum; segmento ultimo confertim, ceteris tribus segmentis obsolete punctatis.

Haec species mihi videtur *I. terminato* C. Waterh. affinis.

Habitat Queensland bor.

Entomologo doctissimo Sidney Olliff, auctori Revisionis Cucujidarum Australiensium hanc speciem dedicavi.