

## NOTE IX.

NOUVELLES ESPÈCES D'ISCHNOGASTER  
(HYMÉNOPTÈRES)

APPARTENANT AU MUSÉE DE LEIDE

PAR

R. DU BUYSSON.

*Ischnogaster coriaceus*, n. sp.

Corps de taille médiocre, à pubescence nulle, la tête et le thorax finement et très densément ponctués-coriacés. Tête jaune, avec le front, le vertex et l'occiput noirs; clypéus deux fois plus long que large, marginé de marron au bord antérieur; mandibules assez grandes, pluridentées. Antennes longues, brunes avec les deux premiers articles ferrugineux. Thorax ferrugineux; le mésonotum, l'écusson et le postécusson noir-brun; l'écusson élevé, subconique très obtus, avec une très légère carène, une petite tache oblique jaune de chaque côté; postécusson avec deux taches jaunes se touchant presque; pronotum ferrugineux avec des teintes jaunes; deux taches lunaires disposées l'une au dessous de l'autre et en sens inverse, jaunes, sur les mésopleures; le segment médiaire convexe-arrondi, brun-ferrugineux dans la moitié basilaire, le reste jaune. Pattes jaunes, les tibia postérieurs brun-ferrugineux, les tarse intermédiaires et postérieurs brun foncé. Ecailles brun-ferrugineux. Ailes hyalines, à reflets irisés, des tons enfumés autour du stigma et dans la radiale. Abdomen noir-brun, le 2<sup>e</sup> segment pétiolé, les 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> segments avec une petite tache jaune basilaire de chaque côté; le 1<sup>er</sup> sternite avec une grande tache

jaune basilaire en forme de V, les autres sternites avec une petite tache jaune de chaque côté. — Un ♂. — Long. 13<sup>mm</sup>.

Patrie: Nouvelle Guinée (Bernstein).

*Ischnogaster foveatus*, n sp.

Corps de petite taille, noir-brun, avec le clypéus (moins une tache discoidal-basilaire), le bord postérieur du pronotum, deux petites lignes sur le mésonotum, deux taches sur l'écusson, la base du postécusson, l'extrémité du segment médiaire, une tache ovale sous les ailes, une tache lunaire sur les mésopleures, les hanches et les genoux, jaune-clair; pubescence blanchâtre, très fine. Tête finement ponctuée, mésonotum striolé-ponctué très finement, écusson et postécusson lisses, segment médiaire finement et irrégulièrement striolé ainsi que les côtés du thorax. Face couverte de longs et denses poils blancs, couchés; clypéus court; antennes épaisses, ferrugineuses; écailles et pattes brun-ferrugineux; ailes hyalines, irisées. Abdomen brun-ferrugineux, avec quelques taches jaunes peu apparentes à la base des segments; le 2<sup>e</sup> segment pétiolé, étroit, avec une grande et profonde fossette ovale-allongé, garnie d'un feutre épais de poils bruns, dressés. — 4 ♂♂. — Long. 12—13<sup>mm</sup>.

Patrie: Salawatti (Bernstein).

Paris, Avril 1907.