

PLANTS COLLECTED BY TH. HERZOG ON HIS SECOND  
BOLIVIAN JOURNEY, 1910—1911

Part IX

LABIATAE

identified by

C. EPLING (Los Angeles)

(listed by J. Th. Koster, Rijksherbarium, Leiden).

(Issued 3. IV. 1950).

**Teucrium L.**

**Teucrium vesicarium** Mill.; Epling, Syn. S. Amer. Lab. in Fedde, Repert., Beih. 85 (1935—1937) 3.

Hab.: im Wald um Santa Cruz, 450 m alt., Jan. 1911, n. 1334.

**Lepechinia Willd.**

**Lepechinia bella** Epling l. c. 21.

Hab.: zwischen Steinen auf dem Kamm des "Meson" bei Samaipata, 2100 m alt., März 1911, Bl. tiefviolett, n. 1762; auf Grashängen des Cerro Sipascoya, 3500 m alt., April 1911, Bl. blau, n. 2051.

**Lepechinia graveolens** (Regel) Epling l. c. 25.

Hab.: häufiger Strauch im subalpinen Gebüsch bei Pojes, 2300—2600 m alt., April 1911, Bl. weiss, Kelch reif lila, n. 2059.

**Lepechinia heteromorpha** (Briq.) Epling l. c. 26.

Hab.: Strauch an der Waldgrenze über Tablas, 3400 m alt., Mai 1911, Bl. weisslich, n. 2140.

**Salvia L.**

Sectio Calosphace Benth.

Subsectio Tomentellae Epling

**Salvia retinervia** Briq.: Epling l. c. 57.

Hab.: Charakterstrauch an trockenen, felsigen Abhängen im Caipendithal, 1000 m alt., Dez. 1910, Bl. tiefblau, n. 1219.

Subsectio Angulatae Epling

**Salvia amplifrons** Briq.; Epling l. c. 71.

Hab.: im Nebelwald des Bergkammes bei Comarapa, 2600 m alt., April 1911, Bl. weiss und lila, n. 1948; ♀, im Bergwald bei Tres Cruces, 1450 m alt., Febr. 1911, Bl. weiss, n. 1593.

Subsectio *Privoideae* Epling**Salvia sophrona** Briq.; Epling l. c. 81.

H a b.: auf Wiesen des Gipfels über Vallegrande, 2550 m alt., März 1911, Bl. tiefblau, n. 1846.

**Salvia tiraquensis** Briq.; Epling l. c. 82.

H a b.: im Wald am Fuss der Sierra de Caipipendi, 1000 m alt., Dez. 1910, Bl. hellblau mit weiss, n. 1224; ♀, Alpenwiesen des Sunchalkammes, 2900 m alt., April 1911, Bl. blau, n. 2005/e.

**Salvia stachydifolia** Benth.; Epling l. c. 82.

H a b.: im Gebüsch an der Cuesta de Duraznillos, 2800 m alt., April 1911, n. 2027.

Subsectio *Chariantha* Epling**Salvia orbignaei** Benth.; Epling l. c. 107.

H a b.: an trockenen Berghängen bei Comarapa, 2200 m alt., April 1911, Bl. rosa, n. 1917.

Subsectio *Cylindriflora* Epling**Salvia praeclara** Epling, l. c. 121.

H a b.: im Gebüsch des Comarapathales, circa 2000 m alt., April 1911, Bl. feuerrot, n. 1877.

**Salvia haenkei** Benth.; Epling l. c. 123.

H a b.: kleiner Strauch an sonnigen Abhängen über Araca, 3500 m alt., Oktober 1911, n. 2334.

**Minthostachys** Griseb.**Minthostachys andina** (Britt.) Epling l. c. 166.

H a b.: kleiner Strauch mit Pfefferminzgeruch im subalpinen Buschgürtel bei Comarapa, 2300 m alt., April 1911, Bl. weiss, n. 1901.

**Scutellaria** L.Sectio *Heteranthesia* Benth.Subsectio *Uliginosae* Epling**Scutellaria breviflora** Benth.; Epling l. c. 174.

H a b.: an Buschrändern hinter Camatindi, 700 m alt., Dez. 1910, n. 1155.

Sectio *Perilomia* (Kunth) Epling**Scutellaria ocymoides** (Kunth) Epling l. c. 178.

H a b.: an steinigten Abhängen zwischen Sunchal und Pojos, 2200 m alt., April 1911, Bl. feuerrot, n. 2008.

**Eriope** KunthSectio *Platanthera* EplingSubsectio *Crassipedes* (Briq.) Epling**Eriope crassipes** Benth.; Epling l. c. 192.

H a b.: auf Bergtriften der Cuesta de los Monos, 1400 m alt., März 1911, Bl. lila, n. 1700.

**Hyptis Jacq.**

**Sectio Buddleioides Benth.**

**Subsectio Umbellatae Epling**

**Hyptis tafallae Benth.; Epling l. c. 221.**

Hab.: Strauch an Abhängen der Felschlucht unterhalb Socotal, 1600 m alt., Juni 1911, Bl. helllila, n. 2245.

**Sectio Mesosphaeria Benth.**

**Subsectio Spicaria (Benth.) Epling**

**Hyptis spicigera Lam.; Epling l. c. 244.**

Hab.: in Santa Cruz aus Samen gezogen; stammt von den Hügelcampos der Provinz Velasco, 300 m/alt., Sept. 1908, blühte April 1911, leg. B. Burela, n. 2205.

**Subsectio Erioccephalae Epling**

**Hyptis eriocephala Benth.; Epling l. c. 248.**

Hab.: in der Felsheide bei Teneria, 3000 m alt., Nov. 1911, n. 2467.

**Hyptis kuntzeana Briq.; Epling l. c. 248.**

Hab.: im Gebüsch am Berg über Valleggrande, 2500 m alt., März 1911, Bl. lila, n. 1793.

**Sectio Polydesmia Benth.**

**Subsectio Vulgares Benth.**

**Hyptis mutabilis Briq.; Epling l. c. 259.**

Hab.: auf Bergwiesen bei Samaipata, 1950 m alt., März 1911, Bl. lila, n. 1785.

**Sectio Myriocephala Benth.**

**Hyptis odorata Benth.; Epling l. c. 263.**

Hab.: Strauch in der Buschregion von Tres Cruces (Cord. de Santa Cruz), 1500 m alt., Febr. 1911, Bl. weiss mit violetten Streifen, n. 1589.

**Sectio Xylodontes (Benth.) Epling**

**Subsectio Axillares (Benth.) Epling**

**Hyptis hirsuta Kunth; Epling l. c. 297.**

Hab.: in den Hügelcampos westlich des Rio Pirai, 500 m alt., Jan. 1911, Bl. weiss, n. 1340.

**Sectio Cephalohyptis Benth.**

**Subsectio Marrubiastrae Benth.**

**Hyptis lappacea Benth.; Epling l. c. 310.**

Hab.: an feuchten Stellen eines Potrero bei Santa Cruz, 450 m alt., Jan. 1911, n. 1373.