




**Korte determinatietabel voor de Nederlandse soorten van
Taraxacum sect. Erythrosperma Dahlst. em. Lindb. f.**

door

J. L. VAN SOEST ('s-Gravenhage)










- 1a Vruchten strokleurig (tot bleekbruin) 2
 Vgl. ook *T. obliquum* (Fr.) Dahlst. in sect. *Obliqua* Dahlst. met buisvormige,
 van buiten oranje bloemen.
- 1b (zie ook c en d) Vruchten in rijpe toestand neutraal bruin (notenhou, donker
 eikenhout, van Dijksbruin, tamme kastanje) tot oranje-achtig bruin 4
- 1c Vruchten geelachtig gebakken steenrood, terra-cotta of licht zalmkleurig 7
- 1d Vruchten roodbruin (mahoniehout, wilde kastanje, donkerrode dakpan) 8
- 2a Stuifmeel aanwezig *Fig. a.* (Alg. op zand) *T. tortilobum* Florstr.
 b Stuifmeel ontbrekend 3
- 3a Bladlobben met veel priemvormige tanden; eindlob meestal in een smal tong-
 vormige top verlengd; buitenste omwindselbladen meestal purper
 *Fig. b.* (Arnhem, Rijnsoever)? *T. tanyolobum* Dahlst.
- 3b Bladlobben zonder of met weinig en dan bredere tanden; eindlob breder, al of
 niet met een brede tongvormige eindslip; buitenste omwindselbladen meestal
 groen *Fig. c.* (Venlo) *T. brakellii* v. Soest
- 4a Stuifmeel ontbrekend *Fig. d.* (Vrij alg. op zand) *T. proximum* Dahlst.
- 4b Stuifmeel aanwezig 5
- 5a Bladslippen min of meer lijnvormig
 (Zeldz. in de duinen)? *T. saphycraspedum* Hagl. & Saarsoo
- 5b Bladslippen duidelijk driehoekig 6



E.V. '66

- 6a Zijlobben dicht opeen (1—2 mm afstand); rand der buitenste omwindselbladen zeer smal (minder dan 0,1 mm) . . . *Fig. e.* (Voorne) *T. pseudoproximum* v. Soest
- 6b Zijlobben, vooral de onderste ver uiteen; rand der buitenste omwindselbladen breed (0,1—0,2 mm)
. *Fig. f.* (Duinen van Rozenburg tot Wassenaar) *T. disseminatum* Hagl.
- 7a Bladsteel felrood *Fig. g.* (Duinen) *T. oxoniense* Dahlst.
- 7b Bladsteel bleekrose *Fig. h.* (Z.-Limburg) *T. glauciniforme* Dahlst.
- 8a Stempels heldergeel 9
- 8b Stempels groenig, vuilgeel tot donkergrijs 10
- 9a Bladsteel zuiver groen; lintbloemen donkergeel
. *Fig. i.* (Duinen van Voorne tot Noordwijk) *T. agaurum* v. Soest
- 9b Bladsteel roodachtig; lintbloemen lichtgeel
. *Fig. j.* (Duinen) *T. commixtum* Hagl.
- 10a Stuifmeel ontbrekend 11
- 10b Stuifmeel aanwezig 12
- 11a Stempels groen; buitenste omwindselbladen sterk teruggeslagen, roodgerand; lintbloemen stralend *Fig. k.* (Duinen) *T. taeniatum* Hagl.
- 11b Stempels vuilgeel; buitenste omwindselbladen aanliggend tot wat teruggebogen aan de top, groenig; lintbloemen vaak kort, weinig langer dan het omwindsel *Fig. l.* (Zandgrond, vrij alg.) *T. silesiacum* Dahlst.
- 12a Hoofdjessel geheel kaal; buitenste omwindselbladen aanliggend, eirond
. *Fig. m.* (Duinen, Z.-Limburg) *T. rubicundum* Dahlst.
- 12b Hoofdjessel onder het hoofdje behaard; buitenste omwindselbladen meestal aan de top teruggebogen 13
- 13a Middennerf van het blad en de rand der tussen de zijlobben gelegen delen (interlobia) diep purper tot bruinpurper gekleurd 14
- 13b Middennerf hogerop niet (of nauwelijks) gekleurd 15
- 14a Zijlobben lijnvormig, aan de voet wat ingesnoerd, uitstaand; bladsteel wijnrood *Fig. n.* (Duinen) *T. dunense* v. Soest
- 14b Zijlobben zeer smal driehoekig, aan de voet het breedst, uitstaand of teruggericht; bladsteel bruinpurper *Fig. o.* (Ierseke) *T. grootil* v. Soest
- 15a Buitenste omwindselbladen duidelijk gerand (ca. 0,1 mm); bladtop breed driehoekig (Zeldz., duinen) *T. polyschistum* Dahlst.
- 15b Buitenste omwindselbladen niet tot smal gerand (tot 0,05 mm) 16
- 16a Eindlob door insnijdingen en zijlobjes slecht definieerbaar t.o.v. de bovenste zijlobben, verlengd. *Fig. p.* (Zandgrond) *T. scanicum* Dahlst.
- 16b Eindlob kort of verlengd, maar dan duidelijk definieerbaar t.o.v. de bovenste zijlobben, althans bij de meeste bladen van een plant 17
- 17a Eindlob verlengd; bladsteel groenig tot rose
. *Fig. q.* (Duinen) *T. laetiforme* Dahlst.
- 17b Eindlob kort, ongeveer even lang als breed; bladsteel purper tot rose 18

Bladen van a: *Taraxacum tortilobum* Florstr.; b: *T. tanyolobum* Dahlst.; c: *T. brakelli* v. Soest; d: *T. proximum* Dahlst.; e: *T. pseudoproximum* v. Soest; f: *T. disseminatum* Hagl.; g: *T. oxoniense* Dahlst.; h: *T. glauciniforme* Dahlst.; i: *T. agaurum* v. Soest. Alle $\frac{1}{2} \times$ nat. grootte.



E.V. 66

- 18a Eindlob min of meer drielobbig; buitenste omwindselbladen lancetvormig; lintbloemen stralend; vrucht vrij licht roodbruin
 *Fig. r.* (Zandgrond) **T. lacistophyllum** Dahlst.
- 18b Eindlob meestal meer driehoekig spiesvormig; buitenste omwindselbladen eirond; lintbloemen meestal weinig stralend; vrucht vurig roodbruin
 *Fig. s.* (Zandgrond) **T. brachyglossum** Dahlst.

Summary

A key to the Netherlands species of *Taraxacum* sect. *Erythrosperma* Dahlst. em. Lindb. f.

Bladen van j:	Hagl.; k:	Hagl.; l:	Dahlst.;
m: Dahlst.;	v. Soest; o:	v. Soest; p:	Dahlst.;
q Dahlst.;	r:	s:	†Dahlst. Alle $\frac{1}{2}$ × nat. grootte.