

Korte mededeling

Sedum forsterianum Sm. in Nederland. Vooruitlopend op een in dit blad te verschijnen artikel over het voorkomen van *Sedum forsterianum* Sm. (= *S. elegans* Lej.) in Nederland, verzoekt de schrijver, die bezig is met een cytotaxonomisch onderzoek aan enkele soorten van het genus *Sedum* L., alvast om opgaven van vindplaatsen van deze soort binnen ons land en eventueel om toezending van levend materiaal.

Sedum forsterianum Sm. lijkt op het eerste gezicht sterk op *Sedum reflexum* L., maar verschilt van deze laatste op de volgende punten:

S. forsterianum Sm.: Bladen op doorsnede elliptisch, stomp met een stekelpuntje, aan de uiteinden van de niet-bloeiende stengels in dichte bundels bijeen, na afsterven zwart wordend en niet direct afvallend. Kelkbladen stomp, $2 \times 1,5$ mm. Kroonbladen niet of zwak gekield, ca. 3 maal zo lang als de kelkbladen. Meeldraden en vruchtbeginsels kaal. Bloeitijd juni en begin juli.

S. reflexum L.: Bladen rolrond, spits met een stekelpuntje, aan de uiteinden van de niet-bloeiende stengels niet in dichte bundels bijeen en na afsterven direct afvallend. Kelkbladen spits, $2-3 \times 1,5$ mm. Kroonbladen duidelijk gekield, $2-2,5$ maal zo lang als de kelkbladen. Meeldraden meestal behaard aan de basis. Vruchtbeginsels met papillen aan de basis. Bloeitijd eind juni tot begin augustus.

Sedum forsterianum Sm. is in de vorige eeuw op meerdere plaatsen in ons land gevonden. De mogelijkheid bestaat dan ook dat deze soort, die in de Ardennen en in Luxemburg b.v. vrij algemeen voorkomt, ook heden ten dage nog in het wild in ons land te vinden is. Als eventuele vindplaatsen van *S. forsterianum* Sm. komen het Fluviatiele district en Zuid-Limburg het meest in aanmerking.

Instituut voor Systematische Plantkunde
Provisorium, De Uithof, Utrecht

H. 'T HART