

Korte mededelingen

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. weer op Voorne. Nadat alle oude groeiplaatsen verdwenen waren, hetzij door natuurlijke successie, hetzij door droge zomers of door padverbreding, vond de botanisch analyst D. van der Laan, werkzaam aan het Biol. Station te Oostvoorne tegen de noordmuur van zijn huis in de gemeente Rockanje een klein ex., dat zich in de loop van 1961 goed ontwikkelde en de winter 1961-'62 goed doorkwam. Hij verzocht de eigenaresse de slechte muur bij het plantje niet te repareren, wat deze toezegde.

Rockanje.

C. Sipkes

Crambe maritima L. Op 5 september 1960 vond ik op het strand bij Westenschouwen tegen de duinvoet een niet bloeiende plant, die ik voor bovengenoemde soort gehouden heb, omdat ze er net uitzag als de zeekool, die ik vroeger aan de kust van Zuid-Engeland en Bretagne aantrof. In de hoop, dat de plant de winter zou overleven en het volgende jaar in bloei zou komen, heb ik hem laten staan. Helaas heb ik hem later niet meer teruggevonden, doordat het duin daar in het najaar afgeslagen was.

Serooskerke (Schouwen).

Jac. Viergever

De heer Viergever zond ons tegelijk met deze mededeling een kleurendia toe, waaruit blijkt dat hij werkelijk *Crambe maritima* heeft gevonden. Dit

is de tweede vondst op Schouwen; de soort werd nl. in 1935 bij Renesse gevonden; de enige verdere vondst hier te lande betreft een plant die in 1959 bij Oranjestad op Walcheren werd aangetroffen. v. O. en R.

„Witte raven”. In aansluiting op het artikel van A. P. en J. A. E. de Kleuver in het nummer van maart 1962 van *Gorteria* en de aanvulling daarop in het septembernummer 1962 kan ik mededelen dat door mij nog de volgende planten witbloeiend zijn aangetroffen: *Epilobium angustifolium* L., bij Landsrade, Z.-Limb., op een afvalterrein, aug. 1961; *Gentiana pneumonanthe* L. (bloemen bijna wit met een iets blauwe tint op de kroonslippen), op de heide bij de Makkumerplas, Z. van Beilen, aug. 1962; *Pedicularis sylvatica* L., aan de weg tussen Spier en Wijster (Dr.), aug. 1962; *Linaria cymbalaria* (L.) Mill., (bloemen wit, met gele vlekken op het gehemelte), op stenen muren langs de Maas in Heusden, aug. 1962.

Eindhoven.

A. S. Troelstra

In de wegberm van de Johannespolderse weg even buiten Middelharnis trof ik op 21 okt. 1962 tussen de daar nog talrijk bloeiende planten van *Trifolium pratense* L. een exemplaar aan met zuiver witte bloemen.

Middelharnis.

P. Vroegindewey

Littorella uniflora (L.) Aschers. op het terrein „De Wolf” te Haren. In 1961 werd opgemerkt, dat de bodem van één van de in normale zomers min of meer uitdrogende plasjes in wat wij noemen de „alpiene weide”, over een groot gedeelte van de oppervlakte bedekt was met rozetten van planten, waarvan toen de naam nog niet kon worden vastgesteld. Er trad nl. geen bloei op. Het was duidelijk, dat de vestiging van vóór 1961 dateerde. In de zomer van 1962 werd een spaarzame bloei waargenomen. Bij determinatie bleek, dat we te doen hebben met *Littorella uniflora*.

In Hegi, Ill. Flora von Mitteleuropa VI, 1, p. 195 worden drie vormen vermeld en wel een land- en een watervorm en een vorm van ondiep water. De kenmerken van onze planten komen geheel overeen met de laatste.

Wanneer de vestiging heeft plaats gehad, is niet bij benadering op te geven. Eveneens onbekend is, vanwaar de diasporen zijn gekomen.

Haren, Gr.

E. Laarman