

### Korte mededelingen

**Pistia stratiotes L. toch ook in 1975 gevonden.** Ir. D. Prins, tijdelijk werkzaam aan de afdeling Nederland van het Rijksherbarium, vond in de maand september van 1975 te Voorburg, Z.H., in een slootje tussen de wijk Essesteijn en de spoorbaan verschillende exemplaren van *Pistia stratiotes*. Deze mededeling achterhaalt mijn uitspraak, onlangs gedaan in *Natura* 74 (5), 1977, p. 187, dat ons „in 1974 en 1975 ... geen vondsten uit Nederland van dit „aquarium-adventief” (zijn) gemeld.” De vindplaats is gelegen in uurhok 30.46, zodat het verspreidingskaartje van deze soort op p. 188 van hetzelfde artikel niet behoeft te worden aangevuld.

Overigens is tot nu toe geen enkele vondst bekend van de Watersla in 1977. Dit zou er op kunnen wijzen, dat geen van de vele 100.000-en exemplaren van deze soort, die vorig jaar de watergangen in het Westland deden lijken op met *Eichhornia* dichtgroeide Afrikaanse rivieren, heeft kunnen overwinteren.

Leiden

J. MENNEMA

**Calamagrostis neglecta (Ehrh.) G., M. et Sch. in Z.O.-Friesland.** Deze boreale grassoort, die mij reeds verscheidene jaren uit het Reestdal bekend was, groeit aldaar o.a. samen met de eveneens boreale *Carex aquatilis*. Dezelfde soortencombinaties en geschikte groeiplaatsen treft men ook aan in Z.O.-Friesland en wel in de stroomdalen van Linde, Tjonger en Boorn. De afgelopen jaren kon ik in dit gebied tientallen nieuwe groeiplaatsen noteren van *Carex aquatilis*, maar helaas niet van *Calamagrostis neglecta*.

Op 15 juni 1976 bezocht ik een terrein in de Tjongervallei onder Nieuwehorne (16.15). Dit terrein bestaat uit drassig schraalland („striepen”) met daarin gelegen een aantal dichtgroeide, vroeger uitgeveende gaten en een oude Tjongermeander. Tot mijn grote verrassing zag ik tussen de zachte pluimen van *Calamagrostis canescens* enkele exx. *C. neglecta* staan. Bij nader onderzoek bleek de laatste in ruime mate voor te komen in zo'n 6-tal van bovengenoemde gaten. Ook hier groeit de soort samen met *Carex aquatilis*, verder met o.a. *Carex hudsonii*, *C. acuta* en *C. rostrata*. De uurhokken,




Fig. 1. De uurhokken, waarin

sinds 1950 in Nederland is aangetroffen.

waarin *Calamagrostis neglecta* sinds 1950 in Nederland werd aangetroffen, zijn te vinden in fig. 1.

Tenslotte kan ik nog vermelden, dat in de Tjongervallei een ruilverkaveling is uitgevoerd. Het terrein met *C. neglecta* is echter gespaard gebleven en staat nu onder bescherming van Staatsbosbeheer.

Terwispel

F. RUDOLPHY