

Korte mededelingen

Overwintering van *Myriophyllum aquaticum* (Vell.) Verdc. in Rotterdam. Op 28 oktober 1984 zag ik in een sloot aan de Kralingseweg te Rotterdam (IVON-hok 37.38.23) een drijvende expositie van tropische waterplanten. Het materiaal bestond uit de waterhyacint [*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms-Laub.], watersla (*Pistia stratiotes* L.), *Salvinia auriculata* Aubl. en een mij onbekende soort die door R.W.J.M. van der Ham (Leiden) werd herkend als *Myriophyllum aquaticum* (Vell.) Verdc., de 'zilvermyriophyllum' of 'gepareld vederkruid'. Dit vederkruid was door hem in 1983 gevonden in een sloot bij Moordrecht, waar het de zachte winter 1982-'83 goed doorstond (Gorter 12, p. 14-15).

De genoemde soorten bleken bij navraag afkomstig te zijn van een tuincentrum te Rotterdam. Elk voorjaar werden enkele planten in de sloot gegooid, waarna zij zich in de zomer sterk vermeerderden. In de winter gingen *E. crassipes*, *P. stratiotes* en *S. auriculata* dood; alleen *M. aquaticum* doorstond de winters 1982-'83 en 1983-'84 'vorstelijk'. Dit werd mij nadrukkelijk verzekerd door de tuinder die verantwoordelijk is voor het schoonhouden van de sloot.

Rotterdam

P. Florusse

***Teucrium scordium* L. nog steeds op Voorne.** Op de drie bekende groeiplaatsen in de duinen van Voorne bij Rockanje komt *T. scordium* nog steeds voor. Ook in 1984 heeft de soort in de tweede helft van augustus gebloeid. De soort verspreidt zich meestal door middel van uitlopers. Daar er echter sprake is van drie geheel gescheiden vindplaatsen kan verspreiding door zaad (met slijk aan de poten van vogels?) niet zonder meer worden uitgesloten.

Rockanje

C. Sipkes