

Korte mededelingen

Anagallis tenella (L.) Murr. In de bewerking van de *Primulaceae* voor de in november j.l. verschenen aflevering van de Flora Neerlandica hebben wij vermeld, dat deze soort in het Kempense district, waar zij vroeger meer voorkwam, waarschijnlijk alleen nog maar aan het wiel bij Nieuwkuik groeit. Gelukkig blijkt zij echter in genoemd district nog op twee andere plaatsen voor te komen, nl. volgens opgave van Ir. A. Bakker en de heer J. J. Kleuver (Staatsbosbeheer, 's-Hertogenbosch) aan het Wilhelminakanaal in de gemeente Diessen, en bij Udenhout.

v. O. en R.

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Bij een bezoek, dat wij in het voorjaar van 1961 brachten aan de duinen van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland toonde de heer Van Amersfoort (Wijk aan Zee) ons een exemplaar van *Blackstonia perfoliata* subsp. *serotina* (Koch) Hegi, dat door hem omstreeks 1958 in de duinen bij Wijk aan Zee werd gevonden. Het exemplaar bevindt zich in het herbarium van het museum van genoemd Waterleidingbedrijf te Bakkum.

v. O. en R.

Gentiana cruciata L., die tegenwoordig nog op diverse plaatsen voorkomt in het duingebied tussen 's-Gravenhage en Katwijk en vroeger ook noordelijker werd aangetroffen, in het begin van de 19e eeuw zelfs bij Bloemendaal en Bentveld, werd volgens een opgave in *Natura* van okt. 1946, p. 132 door C. Sipkes uitgezaaid bij Rockanje. Dat de soort op Voorne stand houdt blijkt uit een bericht, dat wij ontvingen van de heer H. Verhey (Leiderdorp), die *G. cruciata* in 1960 vond ten Z.O. van de C. Sipkes-slag. De heer P. Nijhoff ('s-Gravenhage) deelt thans mede, dat een exemplaar door amateur-botanici en opzichters van het natuurmonument „De Beer” in het voorjaar van 1961 gevonden werd in het binnendijkse duingebied op De Beer. De vraag rijst of hier sprake is van natuurlijke verspreiding vanuit Voorne of dat weer uitzaaiing heeft plaats gehad.

v. O. en R.