

Wachtkamer- en standaardlijstsoorten 2003

Ruud van der Meijden & Baudewijn Odé***

* Nationaal Herbarium Nederland/Leiden branch, Postbus 9514, 2300 RA Leiden;
e-mail: meijden@nhn.leidenuniv.nl

** Stichting FLORON, Postbus 9514, 2300 RA Leiden;
e-mail: ode@floron.leidenuniv.nl

Waiting Room and Standard List Species 2003

As a precursor for the forthcoming edition of 'Heukels' Flora van Nederland', a critical survey of species that show a recent increase in occurrence in the Netherlands is presented here. Apart from 49 species which now fully meet the criteria for inclusion in the Standard List (categories e, f, and g), a much longer list of so called 'Waiting Room Species' is given here. 'Waiting Room Species' are species that are in the process of naturalization in the Netherlands. Many of them are ornamental species, which are naturalizing in urban areas.

De oproep om aandacht te geven aan 'nieuwe' soorten voor de Flora of de Standaardlijst heeft een aantal interessante aanvullingen opgeleverd. Bovendien werden daarna enkele belangrijke nieuwe artikelen gepubliceerd over 'nieuwe' soorten: de bijzonder interessante publicatie door Filip Verloove over de nieuwe neofieten in Vlaanderen¹, het (binnenkort te publiceren) boek van Ton Denters over de stadsflora van Nederland², terwijl ook het boek van Remko Andeweg en Piet Florusse ruim aandacht schenkt aan nieuwkomers in de stad³. Zo ontstond een lijst van bijna 200 soorten, waarvan het merendeel niet in de huidige editie van de Heukels' Flora⁴ staat! Dat is een ongekend hoog aantal. Waarschijnlijk heeft de hernieuwde sterke belangstelling voor de flora van urbane gebieden ertoe geleid dat nieuwe soorten eerder zijn ontdekt dan anders het geval zou zijn. Het omgekeerde is waarschijnlijk ook waar: juist omdat er in de urbane gebieden interessante ontwikkelingen plaatsvinden is het lonend voor een florist om daar te gaan zoeken.

Voor de soorten die te zijner tijd in een nieuwe Flora worden opgenomen moesten ook Nederlandse namen worden gevonden. Voor zover die nog niet in de Belgische Flora⁵ stonden, moesten er namen worden gemaakt. Daartoe hebben wij frequent overleg gevoerd met Ivan Hoste (Nationale Plantentuin van België, Meise) en Ton Denters, wat heeft geleid tot een nieuwe lijst van Nederlandse namen. Deze zal in de komende editie van de Standaardlijst worden opgenomen, met een toelichting over de wijzigingen. In dit artikel worden die nieuwe namen aangeduid met één asterisk (*) als de naam helemaal nieuw is, en met twee (**) als de naam gewijzigd is.

Wachtkamersoorten zijn zich spontaan uitbreidende soorten die determineerbaar zijn of met een nieuwe Flora determineerbaar worden; ze zijn echter nog niet op drie plaatsen ingeburgerd. Standaardlijstsoorten zijn wél op minimaal drie plaatsen

ingeburgerd en zijn bovendien goed determineerbaar, bijvoorbeeld door publicatie van sleutels in Heukels' Flora van Nederland, Gorteria of in gemakkelijk verkrijgbare andere determinatiewerken.

Het is een erg subjectieve zaak om te bepalen of een soort uit de bovengenoemde lijst van bijna 200 een (nieuwe) standaardlijstsoort is, of beter als wachtkamersort kan worden geclassificeerd die wel in de Flora moet worden opgenomen. Dat de floristische ontwikkelingen zo snel gaan als tegenwoordig maakt het niet eenvoudiger om te weten of een soort al op meer dan drie plaatsen ingeburgerd is. Bij bomen geldt dat we vaak niet zeker weten of het drie generaties criterium gehaald is. *Aesculus hippocastanum* (Witte paardenkastanje) bijvoorbeeld slaat her en der gemakkelijk op. De nieuwe bomen vormen dan ook weer nieuwe vruchten, waarvan aannemelijk is dat de zaden ook weer kunnen kiemen; of er planten zijn die als derde generatie-individueen kunnen worden aangemerkt is echter geheel onbekend. Bij *Acer negundo* (Vederesdoorn) ligt de zaak om nog een andere reden gecompliceerd: de soort breidt zich vanuit Duitsland sterk uit langs onze rivieren en de bomen zetten zelfs zaad. Maar al te hoog mogen ze niet worden om de scheepvaart niet te belemmeren, dus worden ze vaak ook weer verwijderd.

Uiteindelijk zijn door ons de volgende groepen soorten geselecteerd:

Categorie a. Soorten die wel in de nieuwe Flora moeten worden opgenomen maar die (nog) niet als wachtkamersort kunnen worden beschouwd.

| | | | |
|------|---------------------------------|--------------------------|--|
| 5394 | <i>Chrysanthemum coronarium</i> | Gekroonde ganzenbloem | wegens verwarring met <i>C. segetum</i> |
| 5251 | <i>Damasonium alisma</i> | Stervrucht-waterweegbree | eeuwen geleden wild en mogelijk terug te terug te verwachten |
| 1404 | <i>Galium spurium</i> | Akkerwalstro** | status van de vondsten onduidelijk: mogelijk steeds adventief |
| 5405 | <i>Geranium endressii</i> | Roze ooievaarsbek* | steeds vaker verwilderende sierplant |
| 5406 | <i>Geranium macrorhizum</i> | Rotsooievaarsbek | steeds vaker verwilderende sierplant |
| 5360 | <i>Geranium sylvaticum</i> | Bosooievaarsbek | steeds vaker verwilderende sierplant |
| 5333 | <i>Helianthus rigidus</i> | Stijve aardpeer | wordt verward met <i>Helianthus tuberosus</i> en <i>H. × laetiflorus</i> |
| 2327 | <i>Lycium chinense</i> | Chinese boksdooorn | wegens verwarring met 0773 <i>L. barbarum</i> (Boksdooorn) |
| 5319 | <i>Marsilea quadrifolia</i> | Klaverbladvaren | eenmaal gevonden |
| 5256 | <i>Morus nigra</i> | Zwarte moerbeiboom | verwilderend |
| 5414 | <i>Ophioglossum azoricum</i> | Kleine addertong** | wegens verwarring met 0879 <i>O. vulgatum</i> (Addertong) |
| 1714 | <i>Orlaya grandiflora</i> | Straalscherm | in archeologische context uit Nederland bekend |
| 5418 | <i>Pulmonaria obscura</i> | Ongevekt longkruid | te verwachten |
| 5438 | <i>Salix udensis</i> 'Sekka' | Sachalinwilg* | verwilderd? |
| 5262 | <i>Trapa natans</i> | Waternoot | verdwenen |
| 5446 | <i>Typha minima</i> | Kleinste lisdodde | te verwachten |

Categorie b. Wachtkamersoorten die nieuw in de Flora worden opgenomen.

| | | | |
|------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| 5320 | <i>Acer saccharinum</i> | Witte esdoorn | inburgerend |
| 5321 | <i>Achillea filipendulina</i> | Geel duizendblad | inburgerend |
| 5378 | <i>Aconitum napellus</i> | Blauwe monnikskap | mogelijk deels verward met <i>A. × cammarum</i> |
| 5379 | <i>Adiantum diaphanum</i> | Smal venushaar* | inburgerend op muren |
| 5349 | <i>Adiantum raddianum</i> | Fijn venushaar* | inburgerend op muren |
| 5380 | <i>Agrostis hyemalis</i> | Klein struisgras* | inburgerend |
| 5381 | <i>Agrostis scabra</i> | Zilverstruisgras* | inburgerend |
| 5382 | <i>Alyssum saxatile</i> | Rotsschildzaad | inburgerend op muren |
| 5311 | <i>Amaranthus bouchonii</i> | Franse amarant** | twijfelachtig onderscheid met <i>Amaranthus hybridus</i> (Groene amarant) |
| 5383 | <i>Amaranthus rudis</i> | Hoge amarant | inburgerend langs de Maas |
| 5322 | <i>Anaphalis margaritacea</i> | Prachtrozenkransje | mogelijk al standaardlijstsoort |
| 5384 | <i>Anisantha diandra</i> | Hoge dravik* | taxonomische status onduidelijk, mogelijk ingeburgerd |
| 5313 | <i>Anisantha rigida</i> | Stijve dravik* | taxonomische status onduidelijk, mogelijk ingeburgerd |
| 5350 | <i>Anisantha madritensis</i> | Spaanse dravik* | identiteit ingeburgerde planten deels onzeker |
| 5385 | <i>Berberis aggregata</i> | Roze berberis* | ingeburgerd, o.a. op de Kunderberg |
| 5386 | <i>Brunnera macrophylla</i> | Balkanvergeet-mij-nietje* | status onzeker wegens verwarring met 1626 <i>Omphalodes verna</i> (Russisch vergeet-mij-nietje**) |
| 5387 | <i>Campanula carpatica</i> | Karpatenklokje | inburgerend |
| 5326 | <i>Campanula medium</i> | Mariëtteklokje | op een plaats volledig ingeburgerd |
| 5353 | <i>Campanula portenschlagiana</i> | Dalmatiëklokje* | inburgerend |
| 5352 | <i>Campanula poscharskyana</i> | Kruipklokje* | snel inburgerend |
| 5388 | <i>Campanula pyramidalis</i> | Piramideklokje* | inburgerend |
| 5389 | <i>Capsella rubella</i> | Rood herderstasje | inburgerend |
| 5390 | <i>Carex binervis</i> | Tweenervige zegge | op een plaats volledig ingeburgerd |
| 5391 | <i>Catalpa bignonioides</i> | Trompetboom | inburgerend |
| 5354 | <i>Chaenorhinum organifolium</i> | Marjoleinbekje* | inburgerend |
| 5392 | <i>Chenopodium berlandieri</i> | Texaanse ganzenvoet* | te verwachten |
| 5393 | <i>Chenopodium schraderianum</i> | Gekield duifkruid* | inburgerend |
| 5395 | <i>Conyza bilboana</i> | Ruige fijnstraal* | te verwachten |
| 5327 | <i>Conyza bonariensis</i> | Gevlamde fijnstraal* | inburgerend |
| 5396 | <i>Cotoneaster reheri</i> | Rimpelige mispel* | inburgerend; juiste identiteit deels onzeker |
| 5397 | <i>Cotoneaster salicifolia</i> | Wilgbladige mispel* | inburgerend; juiste identiteit deels onzeker |
| 5398 | <i>Cotoneaster sternianus</i> | Boogmispel* | inburgerend; juiste identiteit deels onzeker |
| 5329 | <i>Crataegus crus-galli</i> | Hanendoorn | inburgerend; juiste identiteit deels onzeker |
| 5330 | <i>Crocus chrysanthus</i> | Vroege crocus | ingeburgerd? |
| 5355 | <i>Cynosurus echinatus</i> | Stekelkamgras | ingeburgerd? |
| 5399 | <i>Cyperus eragrostis</i> | Bleek cypergras | inburgerend |
| 5326 | <i>Daphne laureola</i> | Zwart peperboompje | op twee plaatsen ingeburgerd |
| 5400 | <i>Dittrichia viscosa</i> | Kleverige alant* | inburgerend |
| 5331 | <i>Euphorbia maculata</i> | Straatwolfsmelk* | al volledig ingeburgerd? |
| 5402 | <i>Euphorbia portlandica</i> | Kustwolfsmelk | natuurlijke areaaluitbreiding? |
| 5403 | <i>Galega officinalis</i> | Galega* | inburgerend |
| 5404 | <i>Galium parisiense</i> | Frans walstro | inburgerend |
| 5332 | <i>Geum macrophyllum</i> | Groot nagelkruid** | ingeburgerd? |
| 5407 | <i>Gypsophila paniculata</i> | Pluimgipskruid** | ingeburgerd? |

| | | | |
|------|--------------------------------------|---------------------------|--|
| 5361 | <i>Impatiens balfourii</i> | Tweekleurig springzaad* | inburgerend |
| 5408 | <i>Leycesteria formosa</i> | Fazantenbes | inburgerend |
| 5409 | <i>Limonium humile</i> | IJle lamsoor* | status onduidelijk |
| 5334 | <i>Linaria purpurea</i> | Walstroleeuwenbek* | zowel rose- als paarsbloemige vorm burgeren in |
| 5336 | <i>Lythrum junceum</i> | Kruipkattenstaart | ingeburgerd? Verward met <i>L. hyssopifolia</i> |
| 5410 | <i>Malva verticillata</i> | Dessertbladen | inburgerend; Nederlandse naam eigenlijk voor var. <i>crispa</i> |
| 5411 | <i>Meconopsis cambrica</i> | Schijnpapaver | inburgerend |
| 5412 | <i>Nemesia melissaefolia</i> | Kransnemesia | op één plaats ingeburgerd |
| 5365 | <i>Nepeta mussinii</i> | Blauw kattenkruid* | inburgerend, maar verward |
| 5364 | <i>Nepeta × faassenii</i> | Grijs kattenkruid** | inburgerend, maar verward |
| 5413 | <i>Nonea lutea</i> | Monnikskruid* | op een plaats ingeburgerd |
| 5366 | <i>Papaver atlanticum</i> | Donzige klaproos* | inburgerend |
| 5415 | <i>Papaver pseudoorientale</i> | Oosterse klaproos | inburgerend |
| 5367 | <i>Pauwlonia tomentosa</i> | Anna Paulownaboom | inburgerend |
| 5341 | <i>Persicaria capitata</i> | Kogelduizendknoop* | inburgerend |
| 5368 | <i>Platanus orientalis</i> | Oosterse plataan | inburgerend |
| 5416 | <i>Prunus laurocerasus</i> | Laurierkers | ingeburgerd? |
| 5417 | <i>Pteris cretica</i> | Lintvaren | inburgerend op muren |
| 2298 | <i>Ribes odoratum</i> | Gele ribes | inburgerend, o.a. in de duinen |
| 2310 | <i>Ribes sanguineum</i> | Rode ribes | inburgerend |
| 5370 | <i>Ribes spicatum</i> | Noordse aalbes* | misschien wild: status vooralsnog onduidelijk |
| 5435 | <i>Rostraria cristata</i> | Klein fakkelgras* | inburgerend |
| 5436 | <i>Rubus loganobaccus</i> | Loganbes | op tenminste een plaats ingeburgerd |
| 5437 | <i>Sagittaria latifolia</i> | Breed pijlkruid | inburgerend |
| 1730 | <i>Salvia nemorosa</i> | Bossalie | inburgerend |
| 5342 | <i>Saponaria ocymoides</i> | Muurzeepkruid* | inburgerend op muren |
| 5343 | <i>Schoenoplectus mucronatus</i> | Ribbelbies* | misschien wild: status vooralsnog onduidelijk |
| 5439 | <i>Scilla mischtschenkoana</i> | Streephyacint* | inburgerend? |
| 5440 | <i>Sedum sarmentosum</i> | Driebladvetkruid* | inburgerend |
| 5441 | <i>Senecio cineraria</i> | Zilverkruiskruid* | inburgerend |
| 5442 | <i>Setaria macrocarpa</i> | Chinees naalbaar | ingeburgerd? |
| 5443 | <i>Setaria verticilliformis</i> | Ruwe kransnaalbaar* | misschien ingeburgerd |
| 5345 | <i>Smyrniium perfoliatum</i> | Doorwaskervel* | op twee plaatsen ingeburgerd |
| 1889 | <i>Soleirolia soleirolii</i> | Slaapkamergeluk | al ingeburgerd? |
| 5189 | <i>Sorbaria sorbifolia</i> | Lijsterbesspirea | mogelijk ook verwisseld met <i>S. tomentosa</i> |
| 5444 | <i>Sorbaria tomentosa</i> | Wollige lijsterbesspirea* | mogelijk ook verwisseld met <i>S. sorbifolia</i> |
| 5445 | <i>Tradescantia virginiana</i> | Eendagsbloem | inburgerend |
| 5347 | <i>Verbascum pulverulentum</i> | Vlokkige toorts | misschien wild: status vooralsnog onduidelijk |
| 5447 | <i>Verbena bonariensis</i> | Stijf ijzerhard* | inburgerend |
| 5372 | <i>Veronica acinifolia</i> | Steentijmereprijs | misschien wild: status vooralsnog onduidelijk |
| 5448 | <i>Veronica spicata</i> | Aarereprijs | misschien ingeburgerd maar ook verward met <i>V. longifolia</i> |

Categorie c. Wachtkamersoorten die al wel in de Flora⁴ staan maar nog niet aan alle standaardlijstcriteria voldoen.

| | | | |
|------|---------------------------------|------------------------|--|
| 5018 | <i>Antirrhinum majus</i> | Grote leeuwenbek | nog niet volledig ingeburgerd |
| 2473 | <i>Asplenium septentrionale</i> | Noordse streepvaren | nog niet volledig ingeburgerd |
| 1672 | <i>Calystegia silvatica</i> | Gestreepte winde | taxonomische status van wilde planten niet duidelijk, mogelijk deels hybridegen |
| 5035 | <i>Centranthus ruber</i> | Spoorbloem** | nog niet volledig ingeburgerd |
| 2477 | <i>Chenopodium ambrosioides</i> | Welriekende ganzenvoet | nog niet volledig ingeburgerd |
| 5042 | <i>Clethra alnifolia</i> | Schijn-els* | in ed. 20 opgenomen; nog niet volledig ingeburgerd |
| 2311 | <i>Cornus sericea</i> | Canadese kornoelje | status onduidelijk wegens verwarring of hybridisatie met 5046 <i>C. alba</i> (Witte kornoelje) |
| 1612 | <i>Cyrtomium falcatum</i> | IJzervaren | behoren alle planten tot dezelfde soort? |
| 2487 | <i>Fallopia × bohemica</i> | Bastaardduizendknoop* | status onduidelijk wegens verwarring met de ouders |
| 5079 | <i>Juncus foliosus</i> | Gestreepte greppelrus | huidige verspreiding onduidelijk |
| 5267 | <i>Ornithopus compressus</i> | Geel vogelpootje | nog niet volledig ingeburgerd |
| 1715 | <i>Panicum capillare</i> | Draadgierst | efemeer |
| 1716 | <i>Panicum miliaceum</i> | Pluingierst | nog niet ingeburgerd |
| 2250 | <i>Platanus hispanica</i> | Plataan | nog niet volledig ingeburgerd |
| 5114 | <i>Pontederia cordata</i> | Moerashyacint | nog niet volledig ingeburgerd |
| 5128 | <i>Rosa gallica</i> | Franse roos | nog niet volledig ingeburgerd |
| 2262 | <i>Rosa glauca</i> | Roodbladige roos** | nog niet volledig ingeburgerd |
| 5129 | <i>Rosa multiflora</i> | Veelbloemige roos | deel aangeplant, deels verwilderd |
| 1832 | <i>Sinapis alba</i> | Witte mosterd | nog niet op drie plaatsen ingeburgerd |
| 1886 | <i>Scilla hispanica</i> | Spaanse hyacint | status onduidelijk wegens verwarring met <i>S. × massartiana</i> (Kruishyacint) |

Categorie d. Wegens moderne taxonomische inzichten nieuw in de Flora op te nemen *Rosa*- en *Euphrasia*-soorten die echter nog niet op de standaardlijst worden opgenomen omdat hun herkenbaarheid moeilijk is en hun verspreiding mede daardoor onvoldoende bekend is. De *Rosa*-soorten worden bewerkt door P.A. Bakker, N.C.M. Maes en J.C.A. Rövenkamp. Aangezien de begrenzing van taxa afwijkt van de huidige taxa krijgen de nieuwe *Rosa*-taxa een nieuw nummer. De *Euphrasia*-bewerking wordt ontleend aan J. Lambinon et al., Flora van België⁵.

| | | |
|------|--------------------------------|------------------------|
| 5419 | <i>Rosa agrestis</i> | Kraagroos |
| 5420 | <i>Rosa caesia</i> | Behaarde struweelroos* |
| 5421 | <i>Rosa canina</i> (s. str.) | Hondsroos |
| 5422 | <i>Rosa columnifera</i> | Schijnegelantier* |
| 5423 | <i>Rosa corymbifera</i> | Heggenroos* |
| 5424 | <i>Rosa dumalis</i> | Kale struweelroos* |
| 5425 | <i>Rosa elliptica</i> | Wigbladige roos* |
| 5426 | <i>Rosa micrantha</i> | Kleinbloemige roos |
| 5427 | <i>Rosa pseudoscabriuscula</i> | Ruwe viltroos* |
| 5428 | <i>Rosa sherardii</i> | Berijpte viltroos* |
| 5429 | <i>Rosa stylosa</i> | Stijlroos* |
| 5430 | <i>Rosa subcanina</i> | Schijnhondsroos* |
| 5431 | <i>Rosa subcolina</i> | Schijnheggenroos* |

| | | |
|------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 5432 | <i>Rosa tomentella</i> | Beklierde heggenroos* |
| 5433 | <i>Rosa tomentosa</i> | Viltroos |
| 5434 | <i>Rosa villosa</i> | Bottelroos |
| 1919 | <i>Euphrasia stricta</i> (s. str.) | Stijve ogentroost (s. str.) |
| 0507 | <i>Euphrasia micrantha</i> | Slanke ogentroost |
| 0508 | <i>Euphrasia nemorosa</i> | Bosogentroost |
| 5401 | <i>Euphrasia tetraquetra</i> | Vierrijige ogentroost |

Categorie e. Soorten die ten onrechte van de standaardlijst waren afgevoerd

| | | | |
|------|--------------------------------|------------------|---|
| 0241 | <i>Carex ligERICA</i> | Rivierduinzegge | ten onrechte gelumpt met 0215 <i>C. arenaria</i> (Zandzegge) |
| 0257 | <i>Carex reichenbachiana</i> | Valse zandzegge | ten onrechte gelumpt met 0215 <i>C. arenaria</i> (Zandzegge) |
| 0226 | <i>Carex divisa</i> | Kustzegge** | blijkt niet verdwenen te zijn |
| 0391 | <i>Dactylis polygama</i> | IJle kroppaar | een zeldzaam bosgras |
| 0705 | <i>Lamium confertum</i> | Brede dovenetel | status niet geheel duidelijk |
| 1713 | <i>Oenanthe pimpinelloides</i> | Beverneltorkruid | teruggevonden en nu waarschijnlijk wild |

Categorie f. Standaardlijstsoorten die nieuw in de Flora worden opgenomen

| | | | |
|------|--|-------------------------------|---|
| 5323 | <i>Asclepias syriaca</i> | Zijdeplant | reeds lang op drie plaatsen in de duinen ingeburgerd |
| 5315 | <i>Callitriche truncata</i> | Doorschijnend sterrenkroos | spontane areaaluitbreiding naar het noorden |
| 5314 | <i>Centaurea stoebe</i> | Rijncentaurie | volledig ingeburgerd |
| 5328 | <i>Conyza sumatrensis</i> | Hoge fijnstraal | binnen 10 jaar volledig ingeburgerd |
| 5362 | <i>Lemna turionifera</i> | Knopkroos* | twijfel aan taxonomische status was onterecht |
| 5335 | <i>Ludwigia grandiflora</i> | Waterteunisbloem | binnen 10 jaar volledig ingeburgerd |
| 2326 | <i>Lychnis coronaria</i> | Prikneus | had al veel eerder als standaardlijst-soort moeten worden aangemerkt |
| 5337 | <i>Oxalis dillenii</i> | Knobbelklaverzuring* | vermoedelijk over 't hoofd gezien |
| 5338 | <i>Panicum schinzii</i> | Zuid-Afrikaanse gierst* | afgesplitst van <i>P. dichotomiflorum</i> |
| 5340 | <i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>urens</i> | Brandpastinaak | volledig ingeburgerd |
| 5369 | <i>Potamogeton filiformis</i> | Draadfonteinkruid | nieuwe wilde soort |

Categorie g. Nieuwe standaardlijstsoorten die al in de Flora⁴ stonden.

| | | | |
|------|---|-----------------------|-------------------------------------|
| 5001 | <i>Acer negundo</i> | Vederesdoorn | |
| 1851 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | Witte paardenkastanje | |
| 5007 | <i>Ailanthus altissima</i> | Hemelboom | |
| 5011 | <i>Alnus cordata</i> | Hartbladige els | volledig ingeburgerd |
| 5212 | <i>Berberis thunbergii</i> | Japanse berberis* | |
| 0160 | <i>Bromus lepidus</i> | Sierlijke dravik | tenminste bij Eys wild |
| 2455 | <i>Carex crawfordii</i> | IJle hazenzegge | |
| 5172 | <i>Cotoneaster</i> <i>integerrimus</i> | Wilde dwergmispel | |
| 5307 | <i>Crassula helmsii</i> | Watercrassula | binnen 10 jaar volledig ingeburgerd |
| 2483 | <i>Dittrichia graveolens</i> | Kamferalant** | |

| | | |
|------|--------------------------------|-------------------------|
| 2485 | <i>Erigeron karvinskianus</i> | Muurfijnstraal |
| 2379 | <i>Falcaria vulgaris</i> | Sikkelkruid |
| 1614 | <i>Helianthus tuberosus</i> | Aardpeer |
| 2489 | <i>Helleborus foetidus</i> | Stinkend nieskruid |
| 1860 | <i>Hesperis matronalis</i> | Damastbloem |
| 1700 | <i>Lepidium densiflorum</i> | Dichtbloemige kruidkers |
| 1866 | <i>Lunaria annua</i> | Judaspenning** |
| 5089 | <i>Malva parviflora</i> | Ribbelkaasjeskruid* |
| 0791 | <i>Malva pusilla</i> | Rond kaasjeskruid |
| 2232 | <i>Matteuccia</i> | |
| | <i>struthiopteris</i> | Struisvaren |
| 0863 | <i>Nicandra physalodes</i> | Zegekruid |
| 1820 | <i>Phacelia tanacetifolia</i> | Phacelia |
| 5117 | <i>Potentilla indica</i> | Schijnaardbei |
| 5120 | <i>Prunus mahaleb</i> | Weichselboom |
| 2259 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | Douglasspar |
| 1829 | <i>Rubus laciniatus</i> | Ingesneden braam |
| 5132 | <i>Rubus phoenicolasius</i> | Japanse wijnbes |
| 5133 | <i>Rubus spectabilis</i> | Prachtframboos |
| 5275 | <i>Scirpoides holoschoenus</i> | Kogelbies |
| 1888 | <i>Sedum spurium</i> | Roze vetkruid |
| 5280 | <i>Stachys recta</i> | Bergandoorn |
| 2390 | <i>Syringa vulgaris</i> | Sering |

Zoals gezegd, de keuze tot welke categorie een soort kan worden gerekend is arbitrair, en wij houden ons dan ook aanbevolen voor reacties op het huidige voorstel.

1. F. Verloove. 2002. Ingeburgerde plantensoorten in Vlaanderen. Mededeling van het Instituut voor Natuurbehoud nr. 20. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel (België).
2. T. Denters. In voorbereiding: Stadsplanten; een natuurgids voor in de stad.
3. R. Andeweg & P. Florusse. 2002. Vreemde planten in Rotterdam. Stadsecologische reeks nr. 4. Rotterdam.
4. R. van der Meijden. 1998. Heukels' Flora van Nederland, ed. 22, 1e bijdruk. Groningen.
5. J. Lambinon, J.E. de Langhe, L. Delvosalle & J. Duvigneaud. 1998. Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden, 3e druk. Meise.