

K O R T E M E D E E D E L I N G E N

Asplenium adiantum-nigrum L. Deze soort werd begin Januari 1957 door de heren M. T. Jansen en J. A. E. de Kleuver gevonden op een muurtje bij het station te Veenendaal.

Ceterach officinarum Lamk. et DC. Op dezelfde stenen dam in de omgeving van Woerden waarop een paar jaar geleden o.a. Asplenium adiantum-nigrum werd gevonden, trof C. Sipkes op 18 Dec. 1956 een klein exemplaar van Ceterach of-

ficinarum aan. Een zeer merkwaardige vondst van deze soort, die tot nu toe bij ons alleen in Limburg en vroeger ook bij Paterswolde werd gevonden.

Nieuwe vindplaatsen van *Listera cordata* (L.) R.Br. In 1949 werd *Listera cordata* gevonden op Ameland, in 1953 op Terschelling, terwijl M.T. Jansen de soort in Augustus 1956 ontdekte in het noordelijke dennenbos op Schiermonnikoog. De laatste vindplaats werd op 23 Aug. jl. bezocht door de excursie van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek. Intussen ontvingen wij bericht dat de soort nu ook in Drente werd aangetroffen en wel door G. Jager, medio Mei 1956, in de bossen van de Maatschappij voor Weldadigheid, Boschoord, gem. Vledder, in ca. 4[^]-50 exemplaren op een iets vochtige, sterk beschaduwde plaats in een complex grove dennen met ondergroei van berk, lijsterbes en vogelkers.

Goodyera repens (L.) R.Br. bij Wassenaar. Bij het doorzien van het onlangs ontvangen herbarium van wijlen Dr. H.R. Hoogenraad werd door ons een aantal exemplaren van deze soort aangetroffen, die reeds in Juli 1919 door P.J.N. Brussaard verzameld waren in de duinen van Wassenaar, Kijfhoek, onder dennen. Deze vindplaats was tot nu toe onbekend gebleven. Komt de soort daar tegenwoordig ook nog voor?

v.O. en R.