

#### K O R T E M E D E D E L I N G E N

Myrrhis odorata (L.) Scop. bij Leeuwarden. Als aanvulling op de korte mededeling van Johs. Kemp over het voorkomen van *Myrrhis odorata* langs de spoorlijn bij Koopmans' Meelfabrieken te Leeuwarden (Corr.bl 14) nog de volgende opmerking. Deze vindplaats is niet nieuw. Reeds in 1923 maakte ir. Schweers de heer en mevrouw Koopmans-Forstmann opmerkzaam op het voorkomen van deze plant op precies dezelfde plaats. Enkele jaren later verzamelde J.P. Wiersma de plant er eveneens (herb. Fries Natuurhist. Museum). Nog in 1957 kon ik mij overtuigen dat *Myrrhis odorata* vrij veel en in forse exemplaren op de bekende vindplaats voorkwam.

Sneek, 24 nov. 1959.

D.T.E. v.d. Ploeg.

Nadere gegevens omtrent de vindplaatsen van Sanicula europaea L., Paris quadrifolia L. en Gagea spathacea (Hayne) Salisb. in het Drentse district: Naar aanleiding van de met betrekking tot genoemde soorten gemaakte opmerkingen in het Correspondentieblad no.14 van 16 nov. 1959 moge ik het volgende opmerken:

Sanicula europaea L.

Deze soort is in het Amerbosje door mij gevonden op 16 juni 1953 (en dus niet in 1959, zoals vermeld). De vondst is indertijd reeds vermeld in de lijst van nieuwe vindplaatsen van zeldzame planten in De Levende Natuur.

Paris quadrifolia L.

Voor zover mij bekend is de vindplaats in het genoemde bosje bij Geelbroek (thans Staatsnatuurreservaat) de enige in midden-Drenthe. De soort werd hier door mij voor het eerst gezien op 2 juni 1955; vóórdien is Paris hier echter ontdekt door H.W. Schimmel. Volgens Dr. Beijerinck is Paris quadrifolia vroeger gevonden in het Thijnsbosje bij Mantinge (eveneens Staatsnatuurreservaat). Thans komt deze soort daar niet meer voor.

Gagea spathacea (Hayne) Salisb. werd door mij op 21 april 1954 massaal aangetroffen in het Amerbosje. Deze soort is in 1958 door R.J. Hoogervorst nog ontdekt in een bosje langs het Lieverderdiep bij Roden.

Beilen, 21 dec. 1959.

E. Stapelveld.

Bromus carinatus Hook. & Arn. De nrs. 5 en 7 van het Correspondentieblad bevatten mededelingen over het standhouden van Bromus carinatus Hook. & Arn. resp. bij Leiden en Wageningen. Voorts wordt er in D.L.N. 60, 6, p.141 een vondst van deze soort bij Hilversum vermeld.

In juni 1958 trof ondergetekende deze Bromus aan in de Westelijke haven van Amsterdam op een glooiing langs het IJ. Hoewel de planten wat forser waren dan de gewone vorm, (want halmen tot 90 cm hoog en aartjes tot 4 cm lang), was er in de meeste andere opzichten een goede overeenkomst, waarvan te vermelden de beharing van de onderste bladscheden en van de bladen. (Zie P. Jansen in N.K.A. 56, 1949, p.243). Jammer genoeg was de groeiplaats enige weken later kaal geslagen en de planten zijn ook in 1959 niet meer verschenen.

Amsterdam, 30 dec. 1959.

H.H. Prell.