

LOLIUM PERENNE MET KORTE UITLOPERS

(ontv. 22 Jan. 1957)

Lolium perenne L. staat in de flora's opgegeven als zodevormend. In het algemeen is dit stellig juist. Wat echter aan floristen minder bekend zal zijn, maar aan grasland-specialisten eerder, is dat er rassen van L. perenne bestaan die korte, ondergrondse uitlopers vormen. Schrijver dezes was er tenminste nogal verwonderd over van Engels Raaigras, groeiende op de kade van het Noorderhoofd in het westelijk havengedeelte van Amsterdam de "grasbosjes" aan korte uitlopers ontsproten te zien. De vindplaats met resten van veekoeken maakte het waarschijnlijk, dat hier agrarische producten verladen werden en dat de L. perenne-planten van aangevoerd "graszaad" afkomstig zijn.

Landbouwliteratuur verschafte spoedig de gewenste inlichtingen. In "Ons Grasland" door W.P. Cnossen (Uitgave P. Noordhoff, 1947) staan op p.32 uitstekende foto's van uitlopersvormend Engels Raaigras. Genoemd geschrift bevat op

p.7 een overzicht van verschillende grassen, die boven- en ondergrondse uitlopers kunnen vormen, waarin deze soort ook is opgenomen. Asmus Petersen, "Die Gräser" (Akademie-Verlag, Berlin, 1953) geeft op p.140 de uitspraak van de graslandexpert C.A. Weber, dat het uitlopersvormende Engels Raaigras voor weidegrasland bij uitstek geschikt is en de teelt ervan aanbeveling verdient. Hoewel niet floristisch, is het misschien aardig er gewag van te maken, dat Clossen nog wel een bezwaar vermeldt tegen het uitlopersvormende Eng. Raaigras nl., dat de in de nazomer aan uitlopers ontstane spruiten slecht bewortelen en door het vee gemakkelijk worden losgetrokken (plukken); overal over het land liggen dan de grasrestjes verspreid. Er zijn zeker nog wel meer vermeldingen aangaande deze uitlopersvormende rassen van Engels Raaigras te vinden. Voorstaande opgaaf is maar een greep.

Bij determinatie van grasplanten zonder bloeiwijze kan het van nut zijn met deze afwijkende vormen van L. perenne rekening te houden.

H. H. Prell.