


QUERCUS PETRAEA IN BELGIË

(ontv. 28 juni 1957)

Naar aanleiding van het artikel over *Quercus petraea* in het Corr. bl. no. 4 zend ik u hierbij een kopie van de Belgische verspreidingskaart, omdat daar m.i. wel een en ander uit af te leiden is, dat ook Nederland aanbelangt:

1. Bij het massale verspreidingsgebied ten Z. van de lijn Samber-Maas (de leemten daarin duiden eer op onvoldoende prospectie dan wel op het ontbreken van de soort) sluit het Nederlandse gebied in Z.-Limburg volkomen natuurlijk aan.
2. N.W. van Samber en Maas volgt een gebied met meer open verspreiding (de witte



vlek in E6 - E7 - F5 - F6 - F7 beantwoordt aan het haast boomloze Haspengouw), waarvan men logisch veronderstellen mag, dat het zich voortzet in O.-Noord-Brabant en Limburg ten W. van de Maas. Vgl. de aanduiding op ons kaartje in A6.25 = Oisterwijk, omgeving van Amsens Ven, 1.9.56, Dr. L. Delvosalle, Brussel (tijdens de gezamenlijke excursie KNBV - SRBB).

3. Dan volgt het voorpostengebied, waartoe wellicht ook de Nederlandse vindplaatsen Bergen-op-Zoom en Liesbos kunnen gerekend worden. N.B.: geen enkele vindplaats in het vlakke gedeelte van Vlaanderen en ook niet in de duinen.

Het gehele verspreidingsbeeld in België stemt zeer goed overeen met wat over de verspreiding van deze soort gezegd wordt in Meusel, Vergleichende

Arealkunde: südeuropäisch-montan-mitteleuropäische Art mit atlantisch-zentral-europäische Ausbreitungstendenz.

Ten slotte nog opgave van een paar recente publicaties, waarin waardevolle gegevens voorkomen over de verspreiding in Belg.-Limburg:

A. Galoux, La chênaie sessiliflore de Haute Campine. Essai de biosociologie. 1953. (Min. v. Landb., Best. v. Waters & Bossen, Proefstation Groenendael, Werken, Reeks A no. 8).

A. Bodeux, La chênaie sessiliflore de Haute Campine et sa lande de substitution. 1954. (Vegetatio, vol. 5-6, Centrum voor Bosbiologie, Bokrijk (Limb.).

E. van Rompaey.